ЛП 000024-081110

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению

Левофлорипин®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 200 мг + 400 мг + 150 мг + 10 мг

М.Дж. Биофарм Пвт. Лтд., Индия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения "08" ноября 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав **Каждая таблетка содержит:** *активные вещества*: изониазид 75 мг, левофлоксацина гемигидрат в пересчете на левофлоксацин 200 мг, пиразинамид 400 мг, рифампицин 150 мг и пиридоксина гидрохлорид 10 мг; *вспомогательные вещества*: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, тальк, карбоксиметилкрахмал натрия, кроскармеллоза натрия, готовая смесь «Opadry Brown» (гипромеллоза, железа оксид красный, макрогол-400, титана диоксид, железа оксид желтый, железа оксид черный).	**Состав** **Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:** *активные вещества*: изониазид 75,0 мг, левофлоксацина гемигидрат в пересчете на левофлоксацин 200,0 мг, пиразинамид 400,0 мг, рифампицин 150,0 мг и пиридоксина гидрохлорид 10,0 мг; *вспомогательные вещества*: крахмал кукурузный 140,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 75,2 мг, кремния диоксид коллоидный 30,0 мг, магния стеарат 30,0 мг, тальк 50,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 70,0 мг, кроскармеллоза натрия 34,0 мг; *готовая смесь «Opadry Brown»* 20,0 мг (гипромеллоза 62,50 %, железа оксид красный 18,60 %, макрогол-400 6,25 %, титана диоксид 5,15 %, железа оксид желтый 4,50 %, железа оксид черный 3,00 %).

Руководитель организации владельца РУ (организации заявителя) Пакил А. Ратхер

"11" 11 2010 г.