МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
24 11 22
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ФОРКОКС®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Маклеодз Фармасьютикалз Лтд., Индия

Изменение № 6

Дата внесения изменения «____» 24 11 22 20____ г

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата **ФОРКОКС**	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **ФОРКОКС®**
Торговое название: ФОРКОКС®	**Торговое наименование:** ФОРКОКС®
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами. *Рифампицин.* Рифампицин ускоряет метаболизм фенитоина, хинидина, пероральных антикоагулянтов и противогрибковых препаратов. Антациды, опиаты снижают биодоступность рифампицина. Рифампицин снижает активность пероральных гипогликемических препаратов, пероральных гормональных контрацептивов, препаратов наперстянки, антиаритмиков (дизопирамида, мексилетина), глюкокортикостероидов, дапсона, гидантоинов (фенитоин), гексобарбитала, нортриптилина, бензодиазепинов, половых гормонов, теофиллина, хлорамфеникола, кетоконазола, интроконазола, циклоспорина А,	**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.** *Рифампицин.* Рифампицин ускоряет метаболизм фенитоина, хинидина, пероральных антикоагулянтов и противогрибковых препаратов. Антациды, опиаты снижают биодоступность рифампицина. Рифампицин снижает активность пероральных гипогликемических препаратов, пероральных гормональных контрацептивов, препаратов наперстянки, антиаритмиков (дизопирамида, мексилетина), глюкокортикостероидов, дапсона, гидантоинов (фенитоин), гексобарбитала, нортриптилина, бензодиазепинов, половых гормонов, теофиллина, хлорамфеникола, кетоконазола, итраконазола, циклоспорина А,

Старая редакция	Новая редакция
бета-адреноблокаторов, эналаприла и циметидина. *Изониазид.* Изониазид усиливает эффекты фенитоина, такие как сонливость и атаксия. Преднизолон может существенно снижать концентрацию изониазида в плазме крови у медленых и быстрых ацетиляторов, но этот эффект более выражен у медленных ацетиляторов. Изониазид повышает частоту и тяжесть нарушений функции печени в комбинации с рифампицином у больных с предшествующими заболеваниями печени. Препараты ПАСК, содержащие бентонит (алюминия гидросиликат), назначают спустя четыре часа после приема изониазида. Антациды уменьшают абсорбцию изониазида. Изониазид снижает эффективность пероральных контрацептивных препаратов, пероральных гипогликемических препаратов, теофиллина, тозаломид, витамина B1 (усиливает его экскрецию); уменьшает выведение триазолама; снижает содержание Zn2+ в крови (увеличивает его выведение). *Этамбутол.* Гидроксид алюминия нарушает абсорбцию этамбутола, и поэтому необходимо использовать альтернативные антациды. При совместном применении с нейротоксическими средствами возможно усиление нейротоксического действия этамбутола. *Пиразинамид.* Пиразинамид несколько снижает концентрацию	бета-адреноблокаторов, эналаприла и циметидина. *Изониазид.* Изониазид усиливает эффекты фенитоина, такие как сонливость и атаксия. Преднизолон может существенно снижать концентрацию изониазида в плазме крови у медленных и быстрых ацетиляторов, но этот эффект более выражен у медленных ацетиляторов. Изониазид повышает частоту и тяжесть нарушений функции печени в комбинации с рифампицином у больных с предшествующими заболеваниями печени. Препараты ПАСК, содержащие бентонит (алюминия гидросиликат), назначают спустя четыре часа после приема изониазида. Антациды уменьшают абсорбцию изониазида. Изониазид снижает эффективность пероральных контрацептивных препаратов, пероральных гипогликемических препаратов, теофиллина, тозаламид, витамина B1 (усиливает его экскрецию); уменьшает выведение триазолама; снижает содержание Zn^{2+} в крови (увеличивает его выведение). *Этамбутол.* Гидроксид алюминия нарушает абсорбцию этамбутола, и поэтому необходимо использовать альтернативные антациды. При совместном применении с нейротоксическими средствами возможно усиление нейротоксического действия этамбутола. *Пиразинамид.* Пиразинамид несколько снижает концентрацию

Старая редакция	Новая редакция
изониазида в сыворотке крови, особенно у медленых ацетиляторов.	изониазида в сыворотке крови, особенно у медленных ацетиляторов.
Условия хранения Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в местах, недоступных для детей.	**Условия хранения** В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек По рецепту.	**Условия отпуска:** отпускают по рецепту.

Представитель организации-заявителя Волкова Н. В.

Общество с ограниченной ответственностью "Эдванст Трейдинг" "Advanced Trading" ОГРН 1037739021886 Москва