

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НеоЦитотект

торговое наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий, 10 Е/мл,
лекарственная форма, дозировкаБиотест АГ, ГерманияБиотест Фарма ГмбХ, Германия

наименование производителя, страна


Изменение № 3

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание Жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски, прозрачная или слабо опалесцирующая	Описание Прозрачный или слабо опалесцирующий, бесцветный или светло-желтый раствор
Применение при беременности и в период грудного вскармливания Отсутствие риска применения данного препарата во время беременности не исследовалось в контролируемых клинических исследованиях, поэтому в период беременности и грудного вскармливания его следует использовать с осторожностью. <u>Беременность</u> Была показана способность препаратов иммуноглобулина человека для внутривенного введения проникать через плаценту, возрастающая в течение третьего триместра беременности. Опыт медицинского применения иммуноглобулинов не позволяет ожидать никакого вредного влияния на течение беременности, а также на плод и новорожденного.	Применение при беременности и в период грудного вскармливания Отсутствие риска применения данного препарата во время беременности не исследовалось в контролируемых клинических исследованиях, поэтому в период беременности и грудного вскармливания его следует использовать с осторожностью. <u>Беременность</u> Была показана способность препаратов иммуноглобулина человека для внутривенного введения проникать через плаценту, возрастающая в течение третьего триместра беременности. Опыт медицинского применения иммуноглобулинов, дополнительно подтвержденный данными о применении иммуноглобулина человека антицитомегаловирусного, не позволяет

Старая редакция	Новая редакция
<u>Период грудного вскармливания</u> Иммуноглобулины выделяются в материнское молоко. Никаких отрицательных эффектов на новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, не предполагается. <u>Фертильность</u> Опыт клинического применения иммуноглобулинов показывает, что никаких неблагоприятных эффектов на фертильность не должно ожидать.	ожидать никакого вредного влияния на течение беременности, а также на плод и новорожденного. <u>Период грудного вскармливания</u> Иммуноглобулины выделяются в материнское молоко. Никаких отрицательных эффектов на новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании, не предполагается. <u>Фертильность</u> Опыт клинического применения иммуноглобулинов показывает, что никаких неблагоприятных эффектов на фертильность не должно ожидать.

Представитель компании



Румер Л.Н.