ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению

Апидра®СолоСтар®
Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия

Регистрационный номер ЛСР-007048/09

Изменение № 1

Срок введения изменений с «16» 03 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Инструкция по использованию и обращению предварительно заполненной шприц-ручки СолоСтар® ***Стадия 1. Контроль инсулина*** Необходимо проверить этикетку на шприц-ручке СолоСтар® для того, чтобы убедиться, что он содержит соответствующий инсулин. Для Лантуса шприц-ручка СолоСтар® серого цвета с пурпурной кнопкой для введения инъекции. После снятия колпачка шприца-ручки контролируют внешний вид содержащегося в ней инсулина: раствор инсулина должен быть прозрачен, бесцветен, не содержать видимых твердых частиц и по консистенции напоминать воду.	**Инструкция по использованию и обращению предварительно заполненной шприц-ручки СолоСтар®** ***Стадия 1. Контроль инсулина*** Необходимо проверить этикетку на шприц-ручке СолоСтар® для того, чтобы убедиться, что он содержит соответствующий инсулин. Для Апидры шприц-ручка СолоСтар® синего цвета с темно-синей кнопкой с рельефным кольцом для введения инъекции. После снятия колпачка шприца-ручки контролируют внешний вид содержащегося в ней инсулина: раствор инсулина должен быть прозрачен, бесцветен, не содержать видимых твердых частиц и по консистенции напоминать воду.

Представитель фирмы А.Б.Раскуражев

М.П. «_____»_____ _____г.