МИНЗДРАВ РОССИИ
РК003886/01- 150515
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ИНФЕРОН

(Интерферон лейкоцитарный человеческий)

Интерферон альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 10 000 МЕ

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___»_____150515_____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутримышечно. Препарат растворяют в 2 мл натрия хлорида раствора для инъекций 0,9 %. Время растворения не более 1,5 минут. Растворенный препарат представляет собой бесцветную или с коричневатым оттенком прозрачную жидкость, без примесей и осадка. Для детей до 1 года применяется 0,5 дозы (5000 МЕ), для детей от 1 года до 18 лет и взрослых применяется 1 доза (10000 МЕ). Продолжительность применения препарата при лечении детей до 1 года не должна превышать 1 месяц. Лечение тяжелых и среднетяжелых	**Способ применения и дозы** Внутримышечно. Препарат растворяют в 2 мл натрия хлорида растворителя для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9 %. Время растворения не более 1,5 минут. Растворенный препарат представляет собой бесцветную или с коричневатым оттенком прозрачную жидкость, без примесей и осадка. Для детей до 1 года применяется 0,5 дозы (5000 МЕ), для детей от 1 года до 18 лет и взрослых применяется 1 доза (10000 МЕ). Продолжительность применения препарата при лечении детей до 1 года не должна превышать 1 месяц.

Старая редакция	Новая редакция
форм гриппа и других ОРВИ. Первые 3-5 дней препарат вводят по 1 инъекции ежедневно, а затем переходят на введение через день, общим курсом 6-8 инъекций. При необходимости курс можно продлить до устойчивого улучшения клинического состояния. Лечение острых вирусных гепатитов. Первые 3-7 дней препарат вводят по 1 инъекции ежедневно, а затем переходят на введение через 1-2 дня, общим курсом 14 инъекций. При необходимости курс можно продлить до устойчивой нормализации клинических симптомов и биохимических показателей. Применение в процессе курсов радио- и химиотерапии у онкологических больных. Показанием к применению препарата является лейко- и лимфопения, другие изменения формулы крови, угнетение фагоцитарной активности, а также субъективное ухудшение самочувствия. Инферон вводят по 1 инъекции 2-3 раза в неделю в течение всего курса цитостатического лечения и еще в течение двух недель после его окончания.	Лечение тяжелых и среднетяжелых форм гриппа и других ОРВИ. Первые 3-5 дней препарат вводят по 1 инъекции ежедневно, а затем переходят на введение через день, общим курсом 6-8 инъекций. При необходимости курс можно продлить до устойчивого улучшения клинического состояния. Лечение острых вирусных гепатитов. Первые 3-7 дней препарат вводят по 1 инъекции ежедневно, а затем переходят на введение через 1-2 дня, общим курсом 14 инъекций. При необходимости курс можно продлить до устойчивой нормализации клинических симптомов и биохимических показателей. Применение в процессе курсов радио- и химиотерапии у онкологических больных. Показанием к применению препарата является лейко- и лимфопения, другие изменения формулы крови, угнетение фагоцитарной активности, а также субъективное ухудшение самочувствия. Инферон вводят по 1 инъекции 2-3 раза в неделю в течение всего курса цитостатического лечения и еще в течение двух недель после его окончания.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения: не менее 10 000 МЕ интерферона альфа в ампуле. Растворитель – по 2,0 мл в ампуле. 5 ампул Инферона в комплекте с 5 ампулами растворителя натрия хлорида раствора для инъекций 0,9 % в коробке из картона вместе с инструкцией по применению и ножом или скарификатором ампульным (при необходимости). 10 ампул препарата без растворителя в коробке из картона вместе с инструкцией по применению и ножом или скарификатором ампульным (при необходимости).	**Форма выпуска** Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения: не менее 10 000 МЕ интерферона альфа (1 доза) в ампуле. Растворитель (натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9 %) – по 2,0 мл в ампуле. 5 ампул Инферона в комплекте с 5 ампулами растворителя в коробке из картона вместе с инструкцией по применению и ножом или скарификатором ампульным (при необходимости). 10 ампул препарата без растворителя в коробке из картона вместе с инструкцией по применению и ножом или скарификатором ампульным (при необходимости).
Срок годности 18 месяцев. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.	**Срок годности** 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России

В.Ф. Руденко