ФСП 42 Р №000647/01-170309

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
_____ Г.Г. Онищенко
«10» _____ 2008
№ 01-11

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНФАГЕЛЬ®

гель для местного и наружного применения, 10 000 МЕ/г

Интерферон альфа

Инфагель® представляет собой интерферон альфа-2b рекомбинантный, полученный из генетически модифицированного штамма-продуцента и сорбированный на геле алюминия гидроксида. Входящий в состав геля поливиниловый спирт, обеспечивает необходимую консистенцию и способствует пленкообразованию при высыхании на коже.

Гелеобразная, однородная масса белого или белого с сероватым оттенком цвета. Допускается расслаивание содержимого упаковки, исчезающее при встряхивании.

В 1 г геля содержится 10 000 МЕ интерферона альфа-2 рекомбинантного; вспомогательные вещества: гидроксид алюминия – 40,45 мг; поливиниловый спирт – от 17,5 мг; вода очищенная - до 1 г.

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящий в состав геля интерферон альфа-2b рекомбинантный обладает широким спектром противовирусной активности, бактериостатическим и противовоспалительным действием, а также противоопухолевой и иммуномодулирующей активностью.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лечение герпетических поражений кожи и слизистых – простого и опоясывающего герпеса, рецидивирующего герпеса лица, гениталий, гингивита, герпетического стоматита.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При лечении герпетических поражений гель наносится на пораженные участки кожи и слизистых тонким слоем 2 раза в сутки с интервалом 12 ч и подсушивается в течение 10-15 мин для образования защитной пленки. Продолжительность курса лечения составляет от 3 до 5 дней; до полного исчезновения нарушений целостности кожного покрова и слизистых оболочек.

- Взамен инструкций, утвержденной 22 марта 2007 г.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Препарат не дает побочных действий.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказан лицам, страдающим аллергическими заболеваниями в стадии обострения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Для лечения инфекционно-воспалительных и вирусных заболеваний препарат можно применять в составе комбинированной терапии с антибактериальными препаратами, глюкокортикоидами, индукторами интерферона и противовирусными препаратами.

ФОРМА ВЫПУСКА

По 2 г или 3 г, или 5 г, или 10 г во флаконах стеклянных, укупоренных резиновыми пробками и обжатых алюминиевыми колпачками. Каждый флакон вместе с Инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

По 2 г или 3 г, или 5 г, или 10 г в алюминиевых тубах с бушонами. Каждую тубу вместе с Инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировать и хранить в соответствии с требованиями СП 3.3.2.1248-03, в защищенном от света месте при температуре от 0 до 10 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Отпускается без рецепта.

Рекламации на качество препарата направлять в ФГУН ГИСК им.Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора (119002, г.Москва, Сивцев Вражек, д.41, тел.: (495) 241-39-22, факс: (495) 241-92-38) и на предприятие-производитель ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА» (630099, г.Новосибирск, ул.М.Горького, 17а, тел./факс (383) 363-32-20).

Генеральный директор
ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА» Е.А.Гутова

