МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ИНФАГЕЛЬ®

гель для местного и наружного применения, 10 000 МЕ/г

Производитель: ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА», РОССИЯ

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «25» мая 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Лечение герпетических поражений кожи и слизистых – простого и опоясывающего герпеса, рецидивирующего герпеса лица, гениталий, гингивита, герпетического стоматита.	**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ** Лечение герпетических поражений кожи и слизистых – простого и опоясывающего герпеса, рецидивирующего герпеса лица, гениталий, гингивита, герпетического стоматита. Профилактика гриппа и ОРВИ у взрослых лиц, имевших контакт с больными гриппом и ОРВИ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ При лечении герпетических поражений гель наносится на пораженные участки кожи и слизистых тонким слоем 2 раза в сутки с интервалом 12 ч и подсушивается в течение 10-15 мин для образования защитной пленки. Продолжительность курса лечения со-	**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ** При лечении герпетических поражений гель наносят на пораженные участки кожи и слизистых тонким слоем 2 раза в сутки с интервалом 12 ч и подсушивают в течение 10-15 мин для образования защитной пленки. Продолжительность курса лечения со-

Изменение № 1 к Инструкции Р N000647/01-090710, С.2

Старая редакция	Новая редакция
ставляет от 3 до 5 дней, до полного исчезновения нарушений целостности кожного покрова и слизистых оболочек.	ставляет от 3 до 5 дней, до полного исчезновения нарушений целостности кожного покрова и слизистых оболочек. Для профилактики гриппа и ОРВИ в периоды подъема заболеваемости, препарат наносят на слизистую оболочку носовых ходов 2 раза в сутки с интервалом 12 ч в течение первой и третьей недели курса, на второй неделе делают перерыв.

Генеральный директор
ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА» Е.А.Гутова

СОГЛАСОВАНО:

Директор ФГБУ ГИСК
им. Л.А. Тарасевича
Минздравсоцразвития И.В.Борисевич