МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВИФЕРОН®

МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N001142/01- 161116
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер Р N001142/01

Торговое название препарата ВИФЕРОН®

МНН или группировочное название интерферон альфа-2b

Лекарственная форма мазь для наружного и местного применения

Состав

1 г мази для наружного и местного применения содержит активное вещество: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 40000 МЕ; вспомогательные вещества: альфа - токоферола ацетат 0,02 г, ланолин безводный 0,34 г, вазелин медицинский 0,45 г, масло персиковое 0,12 г, воду очищенную до 1 г.

Описание

Мазь от бело-желтого до желтого цвета, с характерным запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа

Цитокин.

Код АТХ

L03AB05

Фармакологические свойства

Иммуномодулирующий и противовирусный препарат. Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает выраженными противовирусными, антипролиферативными и иммуномодулирующими свойствами. В присутствии вспомогательных веществ, входящих в состав препарата, возрастает специфическая противовирусная активность интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного, усиливается его иммуномодулирующее действие (стимуляция фагоцитарной функции нейтрофилов в очагах поражения).

При наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая.

Показания к применению

Для лечения герпетических инфекций (Herpes simplex 1 и 2 типа) кожи и слизистых оболочек различной локализации.

В составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте от 1 года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Поскольку при наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая и препарат оказывает действие только в очаге поражения, возможно применение препарата ВИФЕРОН®, мазь, при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

При герпетической инфекции мазь наносят тонким слоем на очаги поражения 3-4 раза в сутки, продолжительность лечения составляет 5-7 дней.

Рекомендуется начинать лечение сразу при появлении первых признаков поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение). При лечении рецидивирующего герпеса желательно начинать лечение в продромальном периоде или в самом начале появления признаков рецидива.

Для лечения гриппа и других ОРВИ мазь наносят тонким слоем на слизистую оболочку носовых ходов 3 - 4 раза в сутки: детям от 1 года до 2-х лет 2500 МЕ (1 горошина диаметром 0,5 см) 3 раза в сутки, детям от 2-х до 12 лет 2500 МЕ (1 горошина диаметром 0,5 см) 4 раза в сутки, детям от 12 до 18 лет 5000 МЕ (1 горошина диаметром 1 см) 4 раза в сутки. Длительность лечения составляет 5 дней.

Вскрытая алюминиевая туба хранится в холодильнике 1 месяц.

Передозировка

Не установлено.

Побочное действие

В большинстве случаев препарат ВИФЕРОН®, мазь для наружного и местного применения, переносится хорошо. При нанесении на слизистую оболочку носа побочные эффекты (ринорея, чихание, жжение слизистой оболочки носа) носят слабый и преходящий характер и самостоятельно исчезают после отмены препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими видами деятельности

Не установлено.

Форма выпуска

Мазь для наружного и местного применения 40000 МЕ/г. По 12 г в тубе алюминиевой. 1 туба с инструкцией по применению в пачке из картона.

Срок годности

1 год.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель/организация, принимающая претензии

ООО «ФЕРОН», Россия. 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, телефон/факс (499) 193-30-60.

Директор ООО «ФЕРОН» Е.Ю. Малиновский