МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ВИФЕРОН®

наименование лекарственного препарата

мазь для наружного и местного применения
40000 МЕ/г

лекарственная форма, дозировка

ООО «ФЕРОН», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 121218 20___ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Состав**<br>1 г мази для наружного и местного применения содержит активное вещество: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 40000 МЕ; вспомогательные вещества: альфа - токоферола ацетат 0,02 г, ланолин безводный 0,34 г, вазелин медицинский 0,45 г, масло | **Состав**<br>**Состав на 1 г мази:**<br>*Действующее вещество:* интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 40000 МЕ;<br>*Вспомогательные вещества:* альфа - токоферола ацетат, ланолин безводный, вазелин медицинский, масло персиковое, кальция пантотенат, натрия бензоат, альбумин |

| | |
|---|---|
| персиковое 0,12 г, воду очищенную до 1 г. | человека, натрия ацетата тригидрат, натрия хлорид, динатрия эдетат дигидрат, вода очищенная. |
| **Показания к применению**<br>Для лечения герпетических инфекций (Herpes simplex 1 и 2 типа) кожи и слизистых оболочек различной локализации.<br>В составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте от 1 года. | **Показания к применению**<br>В составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте от 1 года.<br>Для лечения герпетических инфекций (*Herpes simplex* 1 и 2 типа) кожи и слизистых оболочек различной локализации. |
| **Способ применения и дозы**<br>При герпетической инфекции мазь наносят тонким слоем на очаги поражения 3-4 раза в сутки, продолжительность лечения составляет 5-7 дней.<br>Рекомендуется начинать лечение сразу при появлении первых признаков поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение). При лечении рецидивирующего герпеса желательно начинать лечение в продромальном периоде или в самом начале появления признаков рецидива. | **Способ применения и дозы**<br>Для нанесения мази в качестве аппликатора используют ватный тампон.<br>Для лечения гриппа и других ОРВИ мазь наносят тонким слоем на слизистую оболочку носовых ходов: детям от 1 года до 2-х лет полоску мази длиной не более 0,5 см (около 2500 МЕ) 3 раза в сутки, детям от 2-х до 12 лет полоску мази длиной не более 0,5 см (около 2500 МЕ) 4 раза в сутки, детям от 12 до 18 лет полоску мази длиной не более 1 см (около 5000 МЕ) 4 раза в сутки. После нанесения мази необходимо |

| | |
|---|---|
| Для лечения гриппа и других ОРВИ мазь наносят тонким слоем на слизистую оболочку носовых ходов 3 - 4 раза в сутки: детям от 1 года до 2-х лет 2500 МЕ (1 горошина диаметром 0,5 см) 3 раза в сутки, детям от 2-х до 12 лет 2500 МЕ (1 горошина диаметром 0,5 см) 4 раза в сутки, детям от 12 до 18 лет 5000 МЕ (1 горошина диаметром 1 см) 4 раза в сутки. Длительность лечения составляет 5 дней.<br>Вскрытая алюминиевая туба хранится в холодильнике 1 месяц. | помассировать крылья носа для равномерного распределения препарата на слизистой оболочке носовых ходов. Длительность лечения составляет 5 дней.<br>При герпетической инфекции мазь наносят тонким слоем на очаги поражения 3-4 раза в сутки, продолжительность лечения составляет 5-7 дней.<br>Рекомендуется начинать лечение сразу при появлении первых признаков поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение). При лечении рецидивирующего герпеса желательно начинать лечение в продромальном периоде или в самом начале появления признаков рецидива.<br>Вскрытую алюминиевую тубу хранят в холодильнике не более 3 месяцев. |

113714

| | |
|---|---|
| **Срок годности**<br>1 год.<br>Не применять препарат по истечении срока годности. | **Срок годности**<br>2 года.<br>Не применять препарат по истечении срока годности. |

Исполнительный директор ООО «ФЕРОН» Е.Н. Выжлова

«____» _____ 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕРОН» ОГРН 1027739647270 7733017394 МОСКВА

МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ФГБУ ЦМЭСМП

113714