ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата АЛЬФАРОНА

Регистрационный номер: ЛС-
Торговое название: АЛЬФАРОНА
Международное непатентованное название: Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный
Лекарственная форма: Лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
Состав:
Активные вещества:
Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный – не менее 50 000 МЕ.
Вспомогательные вещества: полиглюкин, натрия хлорид, натрия фосфат однозамещенный 2-водный, натрия фосфат двузамещенный.
В комплекте: вода для инъекций 5 мл (флакон или ампула)

Описание:
Препарат представляет собой лиофилизированный порошок или пористую массу белого или светло-желтого цвета, гигроскопичен; после растворения в 5 мл воды для инъекций образуется прозрачный бесцветный или светло-желтого цвета раствор, без осадка и посторонних включений.

Фармакотерапевтическая группа:
Иммуномодуляторы. Противовирусные средства.
Код АТХ [О3АВ05].

Фармакологические свойства
АЛЬФАРОНА – человеческий рекомбинантный интерферон-альфа-2b – белок, синтезированный штаммом Escherichia coli, в генетический аппарат которой встроен ген человеческого лейкоцитарного интерферона альфа-2b. Альфарона идентичен человеческому лейкоцитарному интерферону альфа-2b.
Обладает противовирусным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, противомикробным действием.

Показания к применению
Профилактика и лечение ОРВИ, гриппа у взрослых и детей на начальных стадиях заболевания.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость препаратов интерферона, аллергические заболевания, протекающие в тяжелой форме.

Способ применения и дозы
Интраназально. Содержимое флакона растворяют в 5 мл воды для инъекций.
При первых признаках заболевания гриппом, ОРВИ: взрослым — по 3 капли в каждый носовой ход 5–6 раз в день (разовая доза — 3000 МЕ, суточная — 15000–18000 МЕ), новорожденным и детям до 1 года — по 1 капле 5 раз в день (разовая доза 1000 МЕ, суточная доза — 5000 МЕ), детям от 1 до 3 лет — по 2 капли 3–4 раза в день (разовая доза — 2000 МЕ, суточная — 6000–8000 МЕ), от 3 до 14 лет — по 2 капли 4–5 раз в день (разовая доза — 2000 МЕ, суточная — 8000–10000 МЕ) в течение 5 дней.
Для профилактики ОРВИ и гриппа:
При контакте с больным и/или при переохлаждении — в соответствии с возрастной дозировкой 2 раза в день в течение 5–7 дней. В случае необходимости профилактические курсы повторяют. При однократном контакте достаточно одного закапывания.
При сезонном повышении заболеваемости — в соответствии с возрастной дозировкой утром через 1–2 дня.
После закапывания рекомендуется помассировать пальцами крылья носа в течение нескольких минут для равномерного распределения препарата в носовой полости.

Побочное действие
Не отмечено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Одновременное применение интраназальных сосудосуживающих препаратов не рекомендуется (способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа).

Форма выпуска
Лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения 50000 МЕ в комплекте с водой для инъекций 5 мл.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше $+10^0$С. Раствор препарата хранить не более 10 дней в холодильнике (не замораживать).

Срок годности
2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта врача.

Производитель
ООО «НПП "Фармаклон"», Россия.
142279, Московская обл., Серпуховский р-н, пос. Оболенск, корп. 72 «А», (0967) 71-74-96, 8-501-443-11-47.

Директор ИДКЭЛС, профессор — Чельцов В.В.

Генеральный директор ООО «НПП "Фармаклон"», доктор медицинских наук — Шмелев В. А.