ЛП-№(014133)-(РГ-RU) от 30.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6023
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Герпферон®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Герпферон®

Группировочное наименование: интерферон альфа-2b + ацикловир + лидокаин

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав:

1 г мази содержит:

Действующие вещества: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный не менее 20 000 МЕ, ацикловир 30 мг, лидокаина гидрохлорид 10 мг;

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, макрогол 1500, макрогол 400.

Описание

Мазь белого или белого с кремоватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии; противомикробные средства, применяемые в дерматологии; противомикробные средства для наружного применения; противовирусные средства.

Код АТХ

D06BB53

Фармакологическое действие

Герпферон®, мазь для местного и наружного применения – комбинированный препарат, обладающий противовирусным, противовоспалительным, иммуномодулирующим и обезболивающим действием.

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает выраженной противовирусной активностью (подавляет репликацию вируса в инфицированных клетках) и иммуномодулирующим эффектом (усиление фагоцитарной активности макрофагов в очагах поражения).

Ацикловир обладает выраженным противовирусным действием. Высокоактивен в отношении вируса Herpes simplex 1 и 2 типа; вируса, вызывающего ветряную оспу и опоясывающий лишай (Varicella zoster).

Лидокаин оказывает местноанестезирующее и умеренное противозудное действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6023
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Сочетание действующих веществ обеспечивает более выраженный противогерпетический эффект: предупреждает образование новых элементов сыпи, снижает вероятность кожной диссеминации, ускоряет заживление, снижает болевые ощущения.

Фармакокинетика

При применении мази системная абсорбция низкая: на интактной коже – всасывание минимальное, в крови и моче не определяется, на пораженной коже всасывание умеренное.

Показания к применению

Первичные и рецидивирующие герпетические поражения кожи и слизистых оболочек, генитальный герпес, опоясывающий герпес.

Противопоказания

Гиперчувствительность к интерферону альфа-2b человеческому рекомбинантному, ацикловиру, лидокаину или к любому из вспомогательных веществ.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Данные по использованию препарата во время беременности и в период кормления грудью отсутствуют. Поэтому применять препарат у этих категорий больных следует только, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Способ применения и дозы

Местно, наружно.

Препарат Герпферон®, мазь для местного и наружного применения наносят на пораженные участки кожи и слизистых тонким слоем 5 раз в день с интервалом 4 часа. Продолжительность курса лечения составляет 5-10 дней.

Побочное действие

Возможно шелушение кожи в месте длительного нанесения мази.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не выявлены.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат совместим и хорошо сочетается с противовоспалительными и иммуномодулирующими лекарственными средствами.

Особые указания

Эффективность лечения препаратом будет тем выше, чем раньше оно начато (при первых признаках инфекции).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Не влияет на способность управления транспортным средством или на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа с движущимися механизмами и пр.).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6023
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения, 20 000 МЕ/г + 30 мг/г + 10 мг/г.

По 5 г в тубах алюминиевых с бушонами.

По одной тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Опускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителя

ООО «Фирн М», 108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А

Тел.: 8 (495) 956-15-43