МИНЗДРАВ РОССИИ
Л N013888/01-290415
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Орунгал®

Капсулы, 100 мг

Янссен-Силаг С.п.А., Италия или ЗАО «МФПДК «Биотек», Россия

Изменение № 2

Дата внесения изменения «___» 290415 20__г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания – Гиперчувствительность к итраконазолу или вспомогательным веществам; – Одновременный прием препаратов субстратов изофермента CYP3A4 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»), таких как: - левацетилметадон, метадон; - дизопирамид, дофетилид, дронедарон, хинидин; - галофантрин;	**Противопоказания** – Гиперчувствительность к итраконазолу или вспомогательным веществам; – Одновременный прием препаратов субстратов изофермента CYP3A4 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»), таких как: - левацетилметадон, метадон; - дизопирамид, дофетилид, дронедарон, хинидин; - телитромицин у пациентов с нарушениями функции почек или печени тяжелой степени; - тикагрелор; - галофантрин;

Старая редакция	Новая редакция
- астемизол, мизоластин, терфенадин; - алкалоиды спорыньи: дигидроэрготамин, эргометрин (эргоновин), эрготамин, метилэргометрин (метилэргоновин), элетриптан; - иринотекан; - лурасидон, мидазолам для перорального приема, пимозид, сертиндол, триазолам; - бепридил, фелодипин, лерканидипин, нисолдипин; - ивабрадин, ранолазин; - эплеренон; - цизаприд; - ловастатин, симвастатин, аторвастатин; - колхицин у пациентов с нарушениями функции печени или почек. – Хроническая сердечная	- астемизол, мизоластин, терфенадин; - алкалоиды спорыньи: дигидроэрготамин, эргометрин (эргоновин), эрготамин, метилэргометрин (метилэргоновин), элетриптан; - иринотекан; - луразидон, мидазолам для перорального приема, пимозид, сертиндол, триазолам; - бепридил, фелодипин, лерканидипин, нисолдипин; - ивабрадин, ранолазин; - эплеренон; - цизаприд, домперидон; - ловастатин, симвастатин, аторвастатин; - фезотеродин у пациентов с недостаточностью функции почек или печени умеренной или тяжелой степени, солифенацин у пациентов с недостаточностью функции почек тяжелой степени и с недостаточностью функции печени умеренной или тяжелой степени; - колхицин у пациентов с нарушениями функции печени или почек. – Хроническая сердечная

Старая редакция	Новая редакция
недостаточность в настоящее время или в анамнезе (за исключением терапии жизнеугрожающих или других опасных инфекций. См. раздел «Особые указания»). – Непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. – Детский возраст до 3 лет. – Беременность и грудное вскармливание.	недостаточность в настоящее время или в анамнезе (за исключением терапии жизнеугрожающих или других опасных инфекций. См. раздел «Особые указания»). – Непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. – Детский возраст до 3 лет. – Беременность и грудное вскармливание.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами Итраконазол преимущественно метаболизируется изоферментом CYP3A4. Другие лекарственные препараты, которые также метаболизируются с участием данного изофермента или изменяют его активность, могут влиять на фармакокинетику итраконазола. Сходным образом итраконазол может влиять на фармакокинетику лекарственных средств, которые также метаболизируются при участии данного изофермента. Итраконазол относится к сильным ингибиторам изофермента CYP3A4 и Р-гликопротеина. При использовании итраконазола совместно с другими лекарственными средствами рекомендуется ознакомиться с инструкцией по применению для выяснения способа метаболизма препарата и решения вопроса о	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами** Итраконазол преимущественно метаболизируется изоферментом CYP3A4. Другие лекарственные препараты, которые также метаболизируются с участием данного изофермента или изменяют его активность, могут влиять на фармакокинетику итраконазола. Сходным образом итраконазол может влиять на фармакокинетику лекарственных средств, которые также метаболизируются при участии данного изофермента. Итраконазол относится к сильным ингибиторам изофермента CYP3A4 и Р-гликопротеина. При использовании итраконазола совместно с другими лекарственными средствами рекомендуется ознакомиться с инструкцией по применению для выяснения способа метаболизма препарата и решения вопроса о

Старая редакция	Новая редакция
необходимости изменения его дозы. ***Лекарственные препараты, которые могут снижать концентрацию итраконазола в плазме крови*** Лекарственные препараты, снижающие кислотность желудочного сока (например, антацидные средства, такие как гидроксид алюминия, или средства, подавляющие секрецию соляной кислоты, такие как антагонисты Н2-гистаминовых рецепторов и ингибиторы протонной помпы), нарушают всасывание препарата Орунгал®, капсулы. Данные лекарственные препараты рекомендуется применять с осторожностью в сочетании с препаратом Орунгал®, капсулы: ➢ Итраконазол рекомендуется принимать совместно с кислыми напитками (такими как недиетическая кола) при совместном использовании лекарственных средств, снижающих кислотность желудочного сока. ➢ Рекомендуется принимать лекарственные препараты, нейтрализующие соляную кислоту (например, гидроксид алюминия), минимум за 1 час до или через 2 часа после приема препарата Орунгал®, капсулы. ➢ При совместном приеме лекарственных средств рекомендуется контролировать противогрибковую	необходимости изменения его дозы. ***Лекарственные препараты, которые могут снижать концентрацию итраконазола в плазме крови*** Лекарственные препараты, снижающие кислотность желудочного сока (например, антацидные средства, такие как гидроксид алюминия, или средства, подавляющие секрецию соляной кислоты, такие как антагонисты Н2-гистаминовых рецепторов и ингибиторы протонной помпы), нарушают всасывание препарата Орунгал®, капсулы. Данные лекарственные препараты рекомендуется применять с осторожностью в сочетании с препаратом Орунгал®, капсулы: ➢ Итраконазол рекомендуется принимать совместно с кислыми напитками (такими как недиетическая кола) при совместном использовании лекарственных средств, снижающих кислотность желудочного сока. ➢ Рекомендуется принимать лекарственные препараты, нейтрализующие соляную кислоту (например, гидроксид алюминия), минимум за 1 час до или через 2 часа после приема препарата Орунгал®, капсулы. ➢ При совместном приеме лекарственных средств рекомендуется контролировать противогрибковую

Старая редакция	Новая редакция
активность итраконазола и увеличивать дозу препарата при возникновении необходимости. Совместное применение итраконазола с сильными индукторами изофермента CYP3A4 может способствовать снижению биодоступности итраконазола и гидроксиитраконазола до такой степени, что будет снижаться эффективность лекарственного средства. Примеры включают следующие препараты: • Антибактериальные средства: изониазид, рифабутин, рифампицин. • Противосудорожные препараты: карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин. • Противовирусные препараты: эфавиренз, невирапин. Таким образом, использование сильных индукторов изофермента CYP3A4 совместно с итраконазолом не рекомендуется. Рекомендуется избегать назначения данных лекарственных средств в течение двух недель до начала приема итраконазола и во время лечения препаратом, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск, связанный со снижением эффективности итраконазола. При совместном приеме лекарственных средств рекомендуется контролировать противогрибковую активность итраконазола	активность итраконазола и увеличивать дозу препарата при возникновении необходимости. Совместное применение итраконазола с сильными индукторами изофермента CYP3A4 может способствовать снижению биодоступности итраконазола и гидроксиитраконазола до такой степени, что будет снижаться эффективность лекарственного средства. Примеры включают следующие препараты: • Антибактериальные средства: изониазид, рифабутин, рифампицин. • Противосудорожные препараты: карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин. • Противовирусные препараты: эфавиренз, невирапин. Таким образом, использование сильных индукторов изофермента CYP3A4 совместно с итраконазолом не рекомендуется. Рекомендуется избегать назначения данных лекарственных средств в течение двух недель до начала приема итраконазола и во время лечения препаратом, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск, связанный со снижением эффективности итраконазола. При совместном приеме лекарственных средств рекомендуется контролировать противогрибковую активность итраконазола

Старая редакция	Новая редакция
и увеличивать дозу препарата при возникновении необходимости.	и увеличивать дозу препарата при возникновении необходимости.
Лекарственные препараты, которые могут вызывать увеличение концентрации итраконазола в плазме крови	***Лекарственные препараты, которые могут вызывать увеличение концентрации итраконазола в плазме крови***
Одновременный прием итраконазола и сильных ингибиторов изофермента CYP3A4 может приводить к увеличению биодоступности итраконазола. Примеры сильных ингибиторов изофермента CYP3A4: • Антибактериальные препараты: ципрофлоксацин, кларитромицин, эритромицин. • Противовирусные средства: дарунавир, усиленный ритонавиром, фосампренавир, усиленный ритонавиром, индинавир, ритонавир.	Одновременный прием итраконазола и сильных ингибиторов изофермента CYP3A4 может приводить к увеличению биодоступности итраконазола. Примеры сильных ингибиторов изофермента CYP3A4: • Антибактериальные препараты: ципрофлоксацин, кларитромицин, эритромицин. • Противовирусные средства: дарунавир, усиленный ритонавиром, фосампренавир, усиленный ритонавиром, индинавир, ритонавир и телапревир.
Данные лекарственные препараты рекомендуется использовать с осторожностью совместно с итраконазолом. Рекомендуется тщательно контролировать состояние пациентов, принимающих итраконазол совместно с сильными ингибиторами изофермента CYP3A4, для своевременного выявления симптомов и признаков усиления или пролонгации фармакологических эффектов итраконазола, при необходимости возможно снижение дозы итраконазола. По возможности рекомендуется контролировать	Данные лекарственные препараты рекомендуется использовать с осторожностью совместно с итраконазолом. Рекомендуется тщательно контролировать состояние пациентов, принимающих итраконазол совместно с сильными ингибиторами изофермента CYP3A4, для своевременного выявления симптомов и признаков усиления или пролонгации фармакологических эффектов итраконазола, при необходимости возможно снижение дозы итраконазола. По возможности рекомендуется контролировать

Старая редакция	Новая редакция
концентрацию итраконазола в плазме крови.	концентрацию итраконазола в плазме крови.
Лекарственные средства, концентрация которых в плазме крови может увеличиваться при совместном использовании с итраконазолом	***Лекарственные средства, концентрация которых в плазме крови может увеличиваться при совместном использовании с итраконазолом***
Итраконазол и его основной метаболит гидроксиитраконазол могут нарушать метаболизм лекарственных препаратов, метаболизируемых изоферментом CYP3A4 и препятствовать транспортировке препаратов под действием Р-гликопротеина. Это может привести к увеличению плазменной концентрации данных лекарственных препаратов и/или их активных метаболитов при совместном приеме с итраконазолом. Повышение плазменной концентрации, в свою очередь, может вызвать усиление или пролонгацию как терапевтических, так и нежелательных эффектов данных лекарственных средств, в результате чего могут возникнуть потенциально угрожающие жизни состояния. Так, увеличение концентрации некоторых препаратов (терфенадин, астемизол, бепридил, мизоластин, цизаприд, дофетилид, хинидин, пимозид, сертиндол, левометадон) может привести к увеличению интервала-QT и желудочковой тахиаритмии, включая случаи желудочковой тахикардии типа "пируэт", которая относится к потенциально опасным для жизни состояниям. После прекращения	Итраконазол и его основной метаболит гидроксиитраконазол могут нарушать метаболизм лекарственных препаратов, метаболизируемых изоферментом CYP3A4 и препятствовать транспортировке препаратов под действием Р-гликопротеина. Это может привести к увеличению плазменной концентрации данных лекарственных препаратов и/или их активных метаболитов при совместном приеме с итраконазолом. Повышение плазменной концентрации, в свою очередь, может вызвать усиление или пролонгацию как терапевтических, так и нежелательных эффектов данных лекарственных средств, в результате чего могут возникнуть потенциально угрожающие жизни состояния. Так, увеличение концентрации некоторых препаратов (терфенадин, астемизол, бепридил, мизоластин, цизаприд, дофетилид, хинидин, пимозид, сертиндол, левометадон) может привести к увеличению интервала-QT и желудочковой тахиаритмии, включая случаи желудочковой тахикардии типа "пируэт", которая относится к потенциально опасным для жизни состояниям. После прекращения

Старая редакция	Новая редакция
лечения плазменная концентрация итраконазола снижается до практически неопределимой в течение от 7 до 14 дней, в зависимости от дозы препарата и продолжительности лечения. У пациентов с циррозом печени или тех, кто одновременно принимает ингибиторы фермента CYP3A4, снижение концентрации препарата может быть даже более медленным. Это особенно важно во время начала проведения терапии с использованием лекарственных препаратов, на метаболизм которых влияет итраконазол.	лечения плазменная концентрация итраконазола снижается до практически неопределимой в течение от 7 до 14 дней, в зависимости от дозы препарата и продолжительности лечения. У пациентов с циррозом печени или тех, кто одновременно принимает ингибиторы фермента CYP3A4, снижение концентрации препарата может быть даже более медленным. Это особенно важно во время начала проведения терапии с использованием лекарственных препаратов, на метаболизм которых влияет итраконазол.
Взаимодействующие лекарственные средства подразделяются на следующие категории:	Взаимодействующие лекарственные средства подразделяются на следующие категории:
- «Противопоказаны»: Ни при каких обстоятельствах нельзя применять данный лекарственный препарат в комбинации с итраконазолом и в течение двух недель после прекращения приема итраконазола.	- «Противопоказаны»: Ни при каких обстоятельствах нельзя применять данный лекарственный препарат в комбинации с итраконазолом и в течение двух недель после прекращения приема итраконазола.
- «Не рекомендуется»: Рекомендуется избегать применения данного лекарственного средства во время лечения и в течение двух недель после прекращения приема итраконазола, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск, связанный с проводимой терапией. Если нельзя избежать использования данной комбинации лекарственных средств, рекомендуется наблюдать за состоянием пациента для своевременного выявления симптомов и признаков усиления или	- «Не рекомендуется»: Рекомендуется избегать применения данного лекарственного средства во время лечения и в течение двух недель после прекращения приема итраконазола, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск, связанный с проводимой терапией. Если нельзя избежать использования данной комбинации лекарственных средств, рекомендуется наблюдать за состоянием пациента для своевременного выявления симптомов и признаков усиления или

Старая редакция	Новая редакция
пролонгации эффектов препаратов или развития побочных эффектов, в случае необходимости лечение можно прервать или уменьшить дозу лекарственных средств. При наличии возможности рекомендуется контролировать плазменную концентрацию препаратов. - «Использовать с осторожностью»: следует проводить тщательный мониторинг при совместном использовании лекарственного препарата с итраконазолом. При совместном использовании лекарственных средств рекомендуется наблюдать за состоянием пациента для своевременного выявления симптомов и признаков усиления или пролонгации эффектов препаратов или развития побочных эффектов, в случае необходимости лечение можно прервать или уменьшить дозу лекарственных средств. При наличии возможности рекомендуется контролировать плазменную концентрацию препаратов. Ниже представлены примеры лекарственных средств, плазменная концентрация которых может увеличиваться под действием итраконазола. Препараты разделены по классам, также даются рекомендации по совместному применению с итраконазолом:	пролонгации эффектов препаратов или развития побочных эффектов, в случае необходимости лечение можно прервать или уменьшить дозу лекарственных средств. При наличии возможности рекомендуется контролировать плазменную концентрацию препаратов. - «Использовать с осторожностью»: следует проводить тщательный мониторинг при совместном использовании лекарственного препарата с итраконазолом. При совместном использовании лекарственных средств рекомендуется наблюдать за состоянием пациента для своевременного выявления симптомов и признаков усиления или пролонгации эффектов препаратов или развития побочных эффектов, в случае необходимости лечение можно прервать или уменьшить дозу лекарственных средств. При наличии возможности рекомендуется контролировать плазменную концентрацию препаратов. Ниже представлены примеры лекарственных средств, плазменная концентрация которых может увеличиваться под действием итраконазола. Препараты разделены по классам, также даются рекомендации по совместному применению с итраконазолом:

Класс лекарственных средств	**Противопоказаны**	**Не рекомендуются**	**Использовать с осторожностью**
Альфа-		Тамсулози	

Класс лекарственных средств	**Противопоказаны**	**Не рекомендуются**	**Использовать с осторожностью**
Альфа-		Тамсулози	

Старая редакция				Новая редакция			
адренобл окаторы		н		адренобл окаторы		н	
Наркоти ческие анальгет ики	Левацетил метадол (левометад ил), метадон	Фентанил	Алфентани л, бупренорф ин для внутривенн ого и сублингвал ьного введения, оксикодон, суфентани л	Наркоти ческие анальгет ики	Левацетил метадол (левометад ил), метадон	Фентанил	Алфентани л, бупренорф ин для внутривенн ого и сублингвал ьного введения, оксикодон, суфентани л
Антиари тмически е средства	Дизопирам ид, дофетилид, дронедарон , хинидин		Дигоксин	Антиари тмически е средства	Дизопирам ид, дофетилид, дронедарон , хинидин		Дигоксин
Противо туберкул езные средства		Рифабутин[a]		Антибак териальн ые средства	Телитроми цин у пациентов с нарушения ми функции почек или печени тяжелой степени	Рифабутин[a]	Телитроми цин
Антикоа гулянты и антиагре ганты		Апиксабан, ривароксаб ан	Кумарины, цилостазол , дабигатран	Антикоа гулянты и антиагре ганты	Тикагрелор	Апиксабан, ривароксаб ан	Кумарины, цилостазол , дабигатран
Противо судорож ные препарат ы		Карбамазе пин[a]		Противо судорож ные препарат ы		Карбамазе пин[a]	
Противо диабетич еские препарат ы			Репаглини д, саксаглипт ин	Противо диабетич еские препарат ы			Репаглини д, саксаглипт ин

Старая редакция				Новая редакция			
Противогельминтные и антипротозойные средства	Галофантрин		Празиквантел	Противогельминтные и антипротозойные средства	Галофантрин		Празиквантел
Антигистаминные препараты	Астемизол, мизоластин, терфенадин		Биластин, эбастин	Антигистаминные препараты	Астемизол, мизоластин, терфенадин		Биластин, эбастин
Лекарства против мигрени	Алкалоиды спорыньи, такие как дигидроэрготамин, эргометрин (эргоновин), эрготамин, метилэргометрин (метилэргоновин)		Элетриптан	Лекарства против мигрени	Алкалоиды спорыньи, такие как дигидроэрготамин, эргометрин (эргоновин), эрготамин, метилэргометрин (метилэргоновин), элетриптан		
Противоопухолевые препараты	Иринотекан	Дасатиниб, нилотиниб, сунитиниб, трабектедин	Бортезомиб, бузульфан, доцетаксель, эрлотиниб, иксабепилон, лапатиниб, триметрексат, алкалоиды барвинка	Противоопухолевые препараты	Иринотекан	Акситиниб, дафрафениб, дасатиниб, ибрутиниб нилотиниб, сунитиниб, трабектедин	Бортезомиб, бузульфан, доцетаксель, эрлотиниб, гефитиниб, иматиниб, иксабепилон, лапатиниб, понатиниб, триметрексат, алкалоиды барвинка
Нейролептики, анксиолитики и снотворные	Лурасидон, мидазолам для перорального приема, пимозид,		Алпразолам, арипипразол, бротизолам,	Нейролептики, анксиолитики и снотворные	Луразидон, мидазолам для перорального приема, пимозид,		Алпразолам, арипипразол, бротизолам,

Старая редакция				Новая редакция			
средства	сертиндол, триазолам		буспирон, галоперидол, мидазолам для внутривенного введения, пероспирон, кветиапин, рамелтеон, рисперидон	средства	сертиндол, триазолам		буспирон, галоперидол, мидазолам для внутривенного введения, пероспирон, кветиапин, рамелтеон, рисперидон
Противовирусные препараты		Симепревир	Маравирок, индинавир[b], ритонавир[b], саквинавир	Противовирусные препараты		Симепревир	Маравирок, индинавир[b], ритонавир[b], саквинавир
Бета-адреноблокаторы			Надолол	Бета-адреноблокаторы			Надолол
Блокаторы «медленных» кальциевых каналов	Бепридил, фелодипин, лерканидипин, нисолдипин		Другие дигидропиридины, верапамил	Блокаторы «медленных» кальциевых каналов	Бепридил, фелодипин, лерканидипин, нисолдипин		Другие дигидропиридины, верапамил
Другие препараты, действующие на сердечно-сосудистую систему	Ивабрадин, ранолазин	Алискирен	Риоцигуат	Другие препараты, действующие на сердечно-сосудистую систему	Ивабрадин, ранолазин	Алискирен, силденафил при лечении легочной гипертензии	Бозентан, риоцигуат
Диуретики	Эплеренон			Диуретики	Эплеренон		
Препараты, влияющие на	Цизаприд		Апрепитант, домперидон	Препараты, влияющие на	Цизаприд, домперидон		Апрепитант

Старая редакция				Новая редакция			
органы желудочно-кишечного тракта				органы желудочно-кишечного тракта			
Иммунос упрессанты		Эверолимус	Будесонид, циклесонид, циклоспорин, дексаметазон, флутиказон, метилпреднизолон, рапамицин (также известный как сиролимус), такролимус, темсиролимус	Иммунос упрессанты		Эверолимус	Будесонид, циклесонид, циклоспорин, дексаметазон, флутиказон, метилпреднизолон, рапамицин (также известный как сиролимус), такролимус, темсиролимус
Препараты, регулирующие липидный обмен	Аторвастатин,ловастатин, симвастатин			Препараты, регулирующие липидный обмен	Аторвастатин,ловастатин, симвастатин		
Препараты, применяемые для лечения заболеваний органов дыхания		Сальметерол		Препараты, применяемые для лечения заболеваний органов дыхания		Сальметерол	
СИОЗС, трициклические и другие антидепрессанты			Ребоксетин	СИОЗС, трициклические и другие антидепрессанты			Ребоксетин

Старая редакция				Новая редакция			
Препараты, используемые в урологии		Варденафил	Фезотеродин, имидафенацин, силденафил, солифенацин, тадалафил, толтеродин	Препараты, используемые в урологии	Фезотеродин у пациентов с недостаточностью функции почек или печени умеренной или тяжелой степени, солифенацин у пациентов с недостаточностью функции почек тяжелой степени и с недостаточностью функции печени умеренной или тяжелой степени	Дарифенацин, варденафил	Фезотеродин, имидафенацин, оксибутинин, силденафил при лечении эректильной дисфункции, солифенацин, тадалафил, толтеродин
Другие	Колхицину пациентов с нарушениями функции печени или почек	Колхицин	Алитретиноин (лекарственные формы для перорального приема), цинакальцет, мозаваптан, толваптан.	Другие	Колхицину пациентов с нарушениями функции печени или почек	Колхицин, кониваптан, толваптан	Алитретиноин (лекарственные формы для перорального приема), цинакальцет, мозаваптан.
[a] *См. также раздел «Лекарственные препараты, которые могут способствовать снижению плазменной концентрации*				[a] *См. также раздел «Лекарственные препараты, которые могут способствовать снижению плазменной концентрации*			

Старая редакция	Новая редакция
итраконазола».	*итраконазола».*
[b] *См. также раздел «Лекарственные препараты, которые могут способствовать увеличению плазменной концентрации итраконазола».*	[b] *См. также раздел «Лекарственные препараты, которые могут способствовать увеличению плазменной концентрации итраконазола».*
Препараты, плазменная концентрация которых может снижаться под действием итраконазола	***Препараты, плазменная концентрация которых может снижаться под действием итраконазола***
Одновременное применение итраконазола с нестероидным противовоспалительным препаратом мелоксикамом может снизить концентрацию мелоксикама в плазме. Рекомендуется с осторожностью назначать мелоксикам одновременно с итраконазолом, а так же тщательно контролировать клиническое состояние пациента и возникновение побочных эффектов. В случае необходимости следует корректировать дозу мелоксикама.	Одновременное применение итраконазола с нестероидным противовоспалительным препаратом мелоксикамом может снизить концентрацию мелоксикама в плазме. Рекомендуется с осторожностью назначать мелоксикам одновременно с итраконазолом, а так же тщательно контролировать клиническое состояние пациента и возникновение побочных эффектов. В случае необходимости следует корректировать дозу мелоксикама.
Дети	***Дети***
Лекарственные взаимодействия изучены только у взрослых людей.	Лекарственные взаимодействия изучены только у взрослых людей.

Специалист по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон» Мадуар В.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон» 1027725029840 * МОСКВА *