ЛП-№(009294)-(РГ-RU) от 06.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.03.2025 № 6765
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИХТИОЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ихтиол

Международное непатентованное или группировочное наименование: ихтаммол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий

Действующее вещество: ихтаммол (ихтиол) – 200 мг.

Вспомогательные вещества: основа для суппозиториев: твердый жир, тип А – достаточное количество до получения суппозитория средней массой 1 ,23 г;

эмульгатор «Твердый – 2» (Т-2) – до 1-5 % к массе основы.

Описание: суппозитории от зеленовато-коричневого до темно-коричневого цвета с запахом ихтиола, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа: другие средства, применяемые в гинекологии.

Код АТХ: G02CX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое действие. Противовоспалительное действие связано с ингибированием высвобождения медиаторов воспаления. При ректальном введении препарат оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, вследствие чего рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, улучшается обмен веществ, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин, яичниках, маточных трубах, матке у женщин.

Фармакокинетика

В связи с низкой абсорбцией ихтаммола, данные по фармакокинетике отсутствуют.

Показания к применению

В составе комплексной терапии: в гинекологии - сальпингоофорит, эндометрит; в урологии - хронический простатит.

Противопоказания

Гиперчувствительность к ихтиолу или к любому из вспомогательных веществ, возраст до 18 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.03.2025 № 6765
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата Ихтиол, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию 1-2 раза в день, после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника и проведения гигиенических процедур. Длительность курса лечения определяется лечащим врачом индивидуально. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Нежелательные реакции сгруппированы по системно-органным классам в соответствии со словарем MedDRA.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Общие нарушения и реакции в месте введения: ощущение жжения в месте введения.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не совместим с растворами солей йода, алкалоидами, солями тяжелых металлов, оксидом цинка. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Ихтиол проконсультируйтесь с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 13.03.2025 № 6765
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 200 мг.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной. По две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения /организация, принимающая претензии

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.

Наименование производителя и адрес места производства лекарственного препарата

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, стр. 3, стр. 8, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.