ЛП-№(005475)-(РГ-RU) от 19.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.05.2024 № 9298
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ихтиоловая мазь

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Ихтиоловая мазь

Международное непатентованное или группировочное наименование: Ихтаммол

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав:	10 %	20 %
действующее вещество:		
ихтиол (ихтаммол)	10 г	20 г
вспомогательное вещество:		
вазелин	90 г	80 г

Описание

Мазь тёмно-коричневого цвета с запахом ихтиола.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии.

Код АТХ: D11AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, оказывает противомикробное (бактерицидное в отношении *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes*), кератопластическое действие. Ускоряет созревание фурункулов. При непосредственном действии на кожу вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся снижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает денатурацию белковых молекул.

Фармакокинетика

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

Показания к применению

Рожистое воспаление, экзема, пиодермия (гнойничковые заболевания кожи) в т.ч. фурункулез, стационарная и регрессирующая стадии псориаза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ихтаммолу и вспомогательным веществам препарата.

Детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.05.2024 № 9298
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

В период беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят тонким слоем на пораженные участки кожи. При необходимости используют окклюзионную повязку. Продолжительность курса лечения и особенности схемы лечения (и у детей, и у взрослых) необходимо согласовать с врачом.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка

Случаи передозировки не известны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не совместим с растворами солей йода, алкалоидами, солями тяжелых металлов, оксидом цинка.

Особые указания

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. После нанесения мази тщательно вымыть руки для предотвращения попадания мази в глаза, нос, рот.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Ихтиоловая мазь не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 10 % и 20 %.

По 25, 30 и 50 г в алюминиевые тубы с бушонами, или тубы из комбинированного материала с бушонами, или тубы ламинатные с бушонами или импортные разрешенные к применению МЗ РФ.

По 25, 30, 50 и 100 г в банки темного стекла с винтовой горловиной с навинчиваемыми пластмассовыми крышками и прокладками, или в банки стеклянные с треугольным венчиком, укупоренные крышками полиэтиленовыми, или по 50, 100 г во флаконы полимерные с крышками с поршнем для выдавливания.

Каждую тубу, флакон или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного. Допускается укладка туб, флаконов или банок в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.05.2024 № 9298
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

На тубу, флакон или банку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей.

Допускается нанесение маркировки непосредственно на тубу или банку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии

АО «Самарамедпром», Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель

АО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, зд. 99Б.