ЛП-№(014637)-(РГ-RU) от 27.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЙОД

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Йод

Международное непатентованное или группировочное наименование: йод

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав:

в 1 мл содержится

Действующее вещество*:* йод – 50 мг

Вспомогательные вещества*:* калия йодид, этиловый спирт 95% (этанол), вода очищенная.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; препараты йода.

Код АТХ D08AG03

Фармакологические свойства

Антисептическое средство. Основным действующим веществом является молекулярный йод, обладающий антисептическим свойством. При нанесении на обширные поверхности кожи йод оказывает резорбтивное действие: активно влияет на обмен веществ, усиливает процессы диссимиляции, участвует в синтезе тироксина и трийодтиронина.

Оказывает бактерицидное действие, как на грамположительную, так и на грамотрицательную флору (активнее всего – *Streptococcus spp. и Escherichia coli*), а также на патогенные грибы и дрожжи. Большинство штаммов *Staphylococcus spp*. устойчивы, однако при длительном применении препарата в 80 % случаев отмечается подавление стафилококковой флоры. *Pseudomonas aeruginosa* устойчива. Препарат мало токсичен.

Фармакокинетика

При контакте с кожей на 30 % превращается в йодиды, а остальная часть – в активный йод. Частично всасывается. Абсорбированная часть проникает в ткани и органы, селективно поглощается щитовидной железой. Выводится почками (главным образом), кишечником, потовыми железами, с грудным молоком в период грудного вскармливания.

Показания к применению

Воспалительные и инфекционные заболевания кожи, ссадины, порезы, микротравмы, раны, воспалительные инфильтраты; обработка краев ран, кожи перед проведением инъекций, пункций, катетеризации.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Противопоказания

Гиперчувствительность к йоду, тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно, смазывают пораженные или подлежащие обработке участки кожи. При обработке операционного поля кожу дважды протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным в растворе. Общее время обработки – 4-6 мин.

Побочное действие

Раздражение кожи, аллергические реакции (кожный зуд), при длительном применении на обширных раненых поверхностях – йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, повышенное слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь).

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, ферментами, восстановителями и щелочами; с белой осадочной ртутью (ртути амидохлоридом) образуется взрывчатая смесь.

Особые указания

Свет и температура выше 40 °С ускоряет распад активного йода. Препарат должен иметь темно-коричневую окраску. Обесцвечивание раствора свидетельствует о разрушении комплекса с переходом активного йода в йодид-ион и снижении активности препарата. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой 5 %.

По 10, 25, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.04.2026 № 7930
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

давления или крышками, унифицированными укупорочно-навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления или полимерных материалов.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или самоклеящиеся этикетки.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «Научно-исследовательский институт Медицины и Стандартизации» (ООО «НИИМиС»)

141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, дом 1А, помещение III, офис 208.

Производитель

Российская Федерация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНТЕК» (АО «СИНТЕК»)

446368, Самарская обл., Красноярский р-н, зона Промышленная (п.Светлое поле), зд.12.

Организация, принимающая претензии от потребителей

Российская Федерация

ООО «Научно-исследовательский институт Медицины и Стандартизации» (ООО «НИИМиС»)

141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, дом 1А, помещение III, офис 208.

Тел./факс +7 (495) 150-19-75