

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛС-002505-

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Йодантипирин®**

наименование лекарственного препарата

**таблетки 100 мг**

лекарственная форма, дозировка

**ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия**

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «  »   2     11   20   г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.</i></li><li><i>• Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.</i></li><li><i>• Это лекарство назначено лично Вам, его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.</i></li></ul> | <p><i>Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.</i></p> <p><i>Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.</i></li><li><i>• Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.</i></li></ul> |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Фармакологические свойства</b></p> <p><b>Фармакодинамика.</b> Йодантипирин® обладает противовоспалительными, иммуностимулирующими и интерфероногенными свойствами. Стабилизирует биологические мембраны и задерживает проникновение вируса в клетку. Является активным индуктором альфа и бета интерферона, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. Активен в отношении вируса клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.</p> <p><b>Фармакокинетика.</b> Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, биодоступность составляет 80 %. До 95 % метаболизируется в печени. Экскреция с мочой через почки путем активного транспорта в почечные канальцы: 3-5 % в неизменном виде, 80-90 % - неактивные метаболиты. Имеет высокое сродство к тканевым белкам. Связывание с белками крови составляет 25 %. Период</p> | <p><b>Фармакологические свойства</b></p> <p><b>Фармакодинамика.</b> Йодантипирин® обладает противовоспалительными, иммуностимулирующими и интерфероногенными свойствами. Стабилизирует биологические мембраны и задерживает проникновение вируса в клетку. Является активным индуктором альфа и бета интерферона, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет. Активен в отношении вируса клещевого энцефалита.</p> <p><b>Фармакокинетика.</b> Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, биодоступность составляет 80 %. До 95 % метаболизируется в печени. Экскреция с мочой через почки путем активного транспорта в почечные канальцы: 3-5 % в неизменном виде, 80-90 % - неактивные метаболиты. Имеет высокое сродство к тканевым белкам. Связывание с белками крови составляет 25 %. Период полувыведения - около 6 часов.</p> |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>полувыведения - около 6 часов.</p> <p><b>Показания к применению</b></p> <p>Йодантипирин® применяется для лечения и профилактики клещевого энцефалита у взрослых, для комплексного лечения геморрагической лихорадки с почечным синдромом.</p> <p><b>Способ применения и дозы</b></p> <p>Таблетки Йодантипирина® принимают внутрь после еды.</p> <p><u>Профилактика и лечение клещевого энцефалита:</u></p> <p><i>Лечение:</i></p> <p>По 300 мг (3 таблетки) – 3 раза в день в течение первых 2-х дней; по 200 мг (2 таблетки) – 3 раза в день в течение следующих 2-х дней; по 100 мг (1 таблетка) – 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней.</p> <p><i>Профилактика:</i></p> <p>а) после присасывания клеща:</p> <p>по 300 мг (3 таблетки) – 3 раза в день в течение первых 2-х дней; по 200 мг (2 таблетки) – 3 раза в день в течение следующих 2-х дней; по 100 мг (1 таблетка) – 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней.</p> | <p><b>Показания к применению</b></p> <p>Профилактика клещевого энцефалита у взрослых, в том числе экстренная профилактика после присасывания клеща.</p> <p><b>Способ применения и дозы</b></p> <p>Таблетки Йодантипирина® принимают внутрь после еды.</p> <p><u>а) после присасывания клеща:</u></p> <p>по 300 мг (3 таблетки) – 3 раза в день в течение первых 2-х дней; по 200 мг (2 таблетки) – 3 раза в день в течение следующих 2-х дней; по 100 мг (1 таблетка) – 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней.</p> <p><u>б) в период пребывания в местах связанных с возможным присасыванием клещей:</u></p> <p>по 200 мг (2 таблетки) 1 раз в день в течение всего периода;</p> <p>по 200 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-х дней перед посещением мест, связанных с возможным присасыванием клещей.</p> |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>б) в период пребывания в местах связанных с возможным присасыванием клещей:</p> <p>по 200 мг (2 таблетки) 1 раз в день в течение всего периода;</p> <p>по 200 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-х дней перед посещением мест, связанных с возможным присасыванием клещей.</p> <p><b>Особые указания</b></p> <p>При лечении и профилактике клещевого энцефалита не рекомендуется совместное применение Йодантипирина® и противоклещевого иммуноглобулина.</p> <p>При очаговых формах клещевого энцефалита вначале назначается специфический иммуноглобулин по обычной схеме и через 2-3 дня назначают Йодантипирин® в указанных дозировках.</p> | <p><b>Особые указания</b></p> <p>Не рекомендуется совместное применение Йодантипирина® и противоклещевого иммуноглобулина.</p> <p>Применение препарата Йодантипирин® для профилактики клещевого энцефалита особенно целесообразно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- лицам, имеющим противопоказания к проведению вакцинации и применению иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита, назначаемых в целях специфической профилактики клещевого энцефалита;</li><li>- лицам, ранее прошедшим полный курс вакцинации против клещевого энцефалита, в качестве дополнительной меры профилактики;</li></ul> |

| Старая редакция                                     | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Условия отпуска</b><br/>По рецепту врача.</p> | <p>- при обращении пострадавших на поздних сроках (позже 3-4 дней) после присасывания клеща, когда введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита не показано;</p> <p>- при отсутствии возможности проведения лабораторного исследования клеща либо исследования крови иммуноферментным методом (для обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита) в ситуациях, когда пациент находится в районе, удаленном от специализированных медицинских учреждений или на базе лечебно-профилактического учреждения, где не налажена диагностика клещевых инфекций.</p> <p><b>Условия отпуска</b><br/>Без рецепта.</p> |

Представитель

ООО «Наука, Техника, Медицина»



Сухомлинова В.А.