

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАВЕХОЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Кавехол

Международное непатентованное или группировочное наименование: Какао семян шелухи экстракт

Лекарственная форма: гранулы для приготовления раствора для приема внутрь

Состав

1 упаковка содержит:

Активного компонента

Кавехола экстракта сухого – 0,789 г
(Кака семян шелухи экстракт) с содержанием
общего азота в пересчете на сухое вещество 1,35 %

Вспомогательного вещества

Крахмала картофельного – 0,711 г

Масса гранул в упаковке – 1,5 г

Описание

Гранулы коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей; средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей; другие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Код АТХ: A05AX.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика. Кавехол оказывает выраженное желчегонное действие, стимулируя желчеобразовательную и желчевыделительную функцию печени, активирует синтез желчных кислот; обладает антиоксидантными, мембраностабилизирующими свойствами, проявляет умеренное спазмолитическое действие; при экспериментальном остром

токсическом гепатите оказывает гепатопротекторное действие, нормализуя повышенную активность ферментов аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, нормализует показатели билирубина, общего холестерина, уровней альфа- и гаммаглобулинов, стимулирует дезинтоксикационную функцию печени, восстанавливает морфофункциональную структуру гепатоцитов; клиническое применение кавехола способствует нормализации функции желчного пузыря и желчевыводящих путей, купированию болевого синдрома, уменьшению тошноты, метеоризма, нормализации стула.

Фармакокинетика. Препарат содержит в качестве активного компонента кавехола экстракт сухой (какао семян шелухи экстракт), представляющий собой комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

В качестве желчегонного средства при дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря по гипотоническому типу, при хроническом некалькулезном холецистите, постхолецистэктомическом синдроме.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, возраст до 18 лет.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

С осторожностью

Пациентам сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Способы применения и дозы

Внутрь, по 1 пакету за 30 минут до еды, предварительно растворив содержимое пакета в 100 мл (½ стакана) теплой кипяченой воды.

Курс лечения – 4 недели. Возможно проведение повторного курса по рекомендации врача через 2-3 месяца. Максимальная разовая доза – 3 г (2 пакета), максимальная суточная доза – 6 г (4 пакета).

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы:

Развитие передозировки маловероятно. При передозировке возможно усиление побочных дозозависимых эффектов.

Лечение:

Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучено.

Особые указания

Пациентам сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одном пакете препарата содержится около 0,7 г углеводов (0,06 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особой концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь.

По 1,5 г в пакеты из бумаги упаковочной с полиэтиленовым покрытием или из бумаги ламинированной.

10, 15, 20, 25 или 30 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.