

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое название: Календулы настойка

Лекарственная форма: настойка

Состав:

Для получения настойки необходимо:

Ноготков цветков - 100 г

Спирта этилового 70 % (этанола) - достаточное количество до получения 1 л

Описание

Прозрачная жидкость желтовато-коричневого или зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

Показания к применению

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно - для полоскания горла при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей (тонзиллиты, фарингиты, ларингиты, фаринголарингиты) и слизистой оболочки полости рта (стоматит).

Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

При применении внутрь - острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

С осторожностью (при применении внутрь) - заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Порезы обрабатывают с помощью тампона; при ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на 1 стакан воды) в виде примочек; для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта $\frac{1}{2}$ - 1 стакан водного раствора настойки; внутрь (в качестве желчегонного средства) - по 10-20 капель, перед едой, 3 раза в день.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При приеме внутрь - изжога, тошнота, горечь во рту, усиление болей в животе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В настоящее время не выявлено.

Особые указания

В максимальной суточной дозе препарата содержится 0,7 г абсолютного этилового спирта, что следует учитывать при необходимости управлять автомобилем и работе с движущимися механизмами.

Форма выпуска

Настойка.

По 25, 40, 50, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми крышками или крышками унифицированными укупорочно-навинчиваемыми.

По 100 мл в банки из оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми или крышками навинчиваемыми полиэтиленовыми с уплотнительными элементами.

Каждый флакон или банку помещают в пачку из картона коробочного, полный текст инструкции наносится на пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация принимающая претензии:

ООО "Гиппократ", Россия, 443012 Самара, ул. Охтинская, 10-13.

(846) 955-27-77

Генеральный директор
ООО «Гиппократ»



С.В. Захаров

