МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000043 - 27 06 18
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ноготков лекарственных цветки

(Calendulae officinalis flores)

Регистрационный номер

Торговое наименование: Ноготков лекарственных цветки

Группировочное наименование: Календулы лекарственной цветки

Лекарственная форма: цветки измельченные

Состав: Ноготков лекарственных цветки

Характеристика: Цветки ноготков содержат каротиноиды, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, смолы, слизистые вещества, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества

Описание: Смесь кусочков цветоложа, язычковых, трубчатых цветков, листочков обвертки и их фрагментов, цветоносов, плодов и их кусочков, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 5 мм. Цвет зеленовато-оранжевый или зеленовато-желтый с вкраплениями серовато-зеленого, красновато-оранжевого, оранжевого, светло-желтого, зеленого, желтовато-коричневого и коричневого цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения солоновато-горький.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие: Настой ноготков цветков оказывает противовоспалительное, антисептическое и желчегонное действие

Показания к применению: Местно настой ноготков цветков применяют для полосканий при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит). Внутрь применяют в качестве желчегонного средства при хроническом гастрите, холецистите, холангите.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату, при приеме внутрь – острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы: 10 г (5 столовых ложек) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Оставшееся сырье отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Местно для полосканий полости рта и глотки применяют по 1/2-1 стакану настоя 3-5 раз в день в теплом виде.

Внутрь принимают по 1-2 столовые ложки теплого настоя 2-3 раза в день до еды. Курс лечения при приеме внутрь 3-4 недели, при необходимости - 6 недель.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. При приеме внутрь возможно ощущение горечи во рту, чувство жжения в эпигастральной области, боль в животе.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Не описано.

Особые указания: Если симптомы сохраняются без улучшения более одной недели при местном применении препарата и более двух недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска:

Цветки измельченные по 25 г и 50 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной светозащитной упаковке при температуре не выше 25^0С. Хранить в недоступном для детей месте. Настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Срок годности:

3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Ст.-Медифарм», Россия, 125480, г. Москва, ул.Планерная, д.3, корп.3.

Адрес производства: Россия, 357021, с. Веселое, Кочубеевский район, Ставропольский край.

Генеральный директор
ЗАО «Ст.-Медифарм» Ю.Н. Смирнов