МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000072-260718
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ноготков лекарственных цветки

***(Calendulae officinalis flores)***

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование:** Ноготков лекарственных цветки

**Группировочное наименование:** Календулы лекарственной цветки

**Лекарственная форма:** цветки порошок

**Состав:** Ноготков лекарственных цветки

**Характеристика:** Цветки ноготков содержат каротиноиды, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, смолы, слизистые вещества, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества

**Описание:** Смесь неоднородных измельченных частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Цвет зеленовато-оранжевый или зеленовато-желтый с вкраплениями серовато-зеленого, красновато-оранжевого, оранжевого, светло-желтого, зеленого, желтовато-коричневого или коричневого цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения солоновато-горький.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

**Фармакологическое действие:** Настой ноготков цветков оказывает противовоспалительное, антисептическое и желчегонное действие.

**Показания к применению:** Местно настой ноготков цветков применяют для полосканий при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит). Внутрь применяют в качестве желчегонного средства при хроническом гастрите, холецистите, холангите.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к препарату, при приеме внутрь – острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, детский возраст (до 12 лет).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы:** 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и

настаивают в течение 30 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Местно для полосканий полости рта и глотки применяют по 1/2-1 стакану настоя 3-5 раз в день в теплом виде.

Внутрь принимают по 1-2 столовые ложки теплого настоя 2-3 раза в день до еды. Курс лечения при приеме внутрь 3-4 недели, при необходимости - 6 недель

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции. При приеме внутрь возможно ощущение горечи во рту, чувство жжения в эпигастральной области, боль в животе.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка:** Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** Не описано.

**Особые указания:** Если симптомы сохраняются без улучшения более одной недели при местном применении препарата и более двух недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:** Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

**Форма выпуска:**

Цветки порошок. По 1,5 г в фильтр-пакеты из бумаги термосвариваемой пористой неразмокаемой. По 10, 20, 24, 30 и 50 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку. Допускается пачку картонную с фильтр-пакетами заворачивать в пленку полипропиленовую неокрашенную или пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

**Условия хранения:**

В оригинальной светозащитной упаковке при температуре не выше $25^0$С. Хранить в недоступном для детей месте. Настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

**Срок годности:**

3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ЗАО «Ст.-Медифарм», Россия, 125480, г. Москва, ул. Планерная, д.3, корп.3.

Адрес производства: Россия, 357021, с. Веселое, Кочубеевский район, Ставропольский край.

Генеральный директор
ЗАО «Ст.-Медифарм» Ю.Н. Смирнов