


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ноготков цветки
(Calendulae flores)



Регистрационный номер

Торговое наименование. Ноготков цветки

Международное непатентованное или группировочное наименование. Календулы лекарственной цветки

Лекарственная форма. Цветки цельные

Состав. Календулы лекарственной цветки

Характеристика

Цветки ноготков содержат каротиноиды, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, смолы, слизистые вещества, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, макро- и микроэлементы и другие биологически активные соединения.

Описание

Цельные или частично осыпавшиеся корзинки диаметром до 5 см, без цветоносов или с остатками цветоносов длиной не более 3 см. Обертка серовато-зеленая, одно-, двухрядная; листочки ее линейные, заостренные, густоопушенные. Цветоложе слегка выпуклое, голое. Краевые цветки язычковые, длиной 15-28 мм, шириной 3-5 мм с изогнутой короткой опушенной трубкой, трехзубчатым отгибом, вдвое превышающим обертку, и 4-5 жилками. Цветки расположены в 2-3 ряда у немахровых и в 10-15 рядов у махровых форм. Пестик с изогнутой нижней одногнездной завязью, тонким столбиком и двухлопастным рыльцем. Срединные цветки трубчатые с пятизубчатым венчиком. Изредка встречаются недозрелые плоды и их кусочки различной формы.

Цвет краевых цветков красновато-оранжевый, оранжевый, ярко- или бледно-желтый; срединных - оранжевый, желтовато-коричневый или желтый; незрелых плодов - зеленый, серовато-зеленый, желтовато-зеленый, желтовато-коричневый и коричневый. Запах слабый. Вкус водного извлечения солоновато-горький.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Настой цветков ноготков оказывает противовоспалительное, антисептическое и желчегонное действие.

Показания к применению

Местно настой цветков ноготков применяют для полосканий при воспалительных заболеваниях горла (тонзиллит, фарингит, ларингит) и полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит). Внутрь взрослым назначают в качестве желчегонного средства при хроническом гастрите, холецистите, холангите.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату и другим растениям семейства Астровых; при приеме внутрь - детский возраст (до 18 лет), острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Около 10 г (5 столовых ложек) цветков ноготков помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают 45 минут при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Местно для полосканий полости рта и горла применяют по 1/2-1 стакану теплого настоя 3-5 раз в день.

Внутрь принимают по 1-2 столовые ложки теплого настоя 2-3 раза в день до еды.

Курс лечения при приеме внутрь 3-4 недели, при необходимости – 6 недель.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При приеме внутрь возможно ощущение горечи во рту, чувство жжения в эпигастральной области, боли в животе.

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Если симптомы заболевания сохраняются без улучшения более 1 недели при местном применении препарата или более 2 недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Цветки цельные.

По 30 г в пачку из картона с внутренним пакетом из бумаги вместе с инструкцией по применению. Допускается нанесение полного текста инструкции по применению на пачку.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Готовый настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование и адрес производственной площадки производителя

ООО фирма «Фито-Бот», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная, ул. Подгорная, д. 62а, Литер Л.

Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО фирма «Фито-Бот», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная, ул. Подгорная, д. 62а.

Тел/факс (87876) 6-20-21.


Генеральный директор
ООО фирма «Фито-Бот»



В.И. Тихов

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ноготков цветки
(Calendulae flores)



Регистрационный номер

Торговое наименование. Ноготков цветки

Международное непатентованное или группировочное наименование. Календулы лекарственной цветки

Лекарственная форма. Цветки измельченные

Состав. Календулы лекарственной цветки

Характеристика

Цветки ноготков содержат каротиноиды, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, смолы, слизистые вещества, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, макро- и микроэлементы и другие биологически активные соединения.

Описание

Смесь кусочков цветоложа, язычковых, трубчатых цветков, листочков обертки и их фрагментов, цветоносов, изредка кусочков недозрелых плодов, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 5 мм. Кусочки цветоложа голые, часто с сохранившимися остатками обертки по краю; язычковые цветки на верхушке трехзубчатые, обычно с оборванным трубчатым основанием; трубчатые цветки пятизубчатые, часто нераскрывшиеся (в виде бутонов); густоопушенные листочки обертки серовато-зеленого цвета, узкие ланцетовидные с более светлой полосой по краю и слегка выступающей главной жилкой; цилиндрические кусочки цветоносов. Цвет язычковых цветков красновато-оранжевый, оранжевый, ярко-желтый или бледно-желтый; трубчатых цветков светло-желтый, желтый; листочков обертки серовато-зеленый; незрелых плодов – зеленый, серовато-зеленый, желтовато-зеленый, желтовато-коричневый и коричневый; цветоложа – светло-серый, зеленовато- или коричневато-серый; цветоносов – серовато-зеленый.

Цвет измельченных цветков зеленовато-желтый с вкраплениями серовато-зеленого, красновато-оранжевого, оранжевого, светло-желтого, зеленого, желтовато-коричневого и коричневого цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения солоновато-горький.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Настой цветков ноготков оказывает противовоспалительное, антисептическое и желчегонное действие.

Показания к применению

Местно настой цветков ноготков применяют для полосканий при воспалительных заболеваниях горла (тонзиллит, фарингит, ларингит) и полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит). Внутри взрослым назначают в качестве желчегонного средства при хроническом гастрите, холецистите, холангите.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату и другим растениям семейства Астровых; при приеме внутрь - детский возраст (до 18 лет), острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Около 10 г (5 столовых ложек) цветков ноготков помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, затем охлаждают 45 минут при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Местно для полосканий полости рта и горла применяют по 1/2-1 стакану теплого настоя 3-5 раз в день.

Внутрь принимают по 1-2 столовые ложки теплого настоя 2-3 раза в день до еды.

Курс лечения при приеме внутрь 3-4 недели, при необходимости – 6 недель.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При приеме внутрь возможно ощущение горечи во рту. Чувство жжения в эпигастральной области, боли в животе.

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Если симптомы заболевания сохраняются без улучшения более 1 недели при местном применении препарата или более 2 недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Цветки измельченные.

По 30 г или 50 г в пачку из картона с внутренним пакетом из бумаги вместе с инструкцией по применению. Допускается нанесение полного текста инструкции по применению на пачку.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Готовый настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование и адрес производственной площадки производителя

ООО фирма «Фито-Бот», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная, ул. Подгорная, д. 62а, Литер Л.

Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО фирма «Фито-Бот», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная, ул. Подгорная, д. 62а.

Тел/факс (87876) 6-20-21.

Генеральный директор

ООО фирма «Фито-Бот»



В.И. Тихов