

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Календулы настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: календулы лекарственной цветков настойка

Лекарственная форма: настойка для приема внутрь, местного и наружного применения

Состав

Для получения настойки используют:

Календулы лекарственной цветки - 100 г

этанола (спирта этилового) 70 % - достаточное количество для получения 1000 мл

Описание: прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета с характерным запахом

Фармакологическая группа: прочие лечебные средства

Код АТХ: V03AX

Фармакологическое действие

Календулы настойка оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное действие.

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых старше 18 лет:

- наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах;
- местно — для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит);
- внутрь календулы настойку применяют при холецистите, холангите в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к календулы лекарственной цветкам или к любому из вспомогательных веществ.

При приеме внутрь: острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения; калькулезный холецистит; беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Наружное и местное применение препарата возможно с учетом ожидаемой пользы для матери и возможного риска для плода или ребенка.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь.

При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют 1/2 - 1 стакан водного раствора настойки. Курс лечения – 1 - 2 недели.

Внутрь за 15 минут до еды применяют по 10 - 20 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Курс лечения – 3 - 4 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек). При приеме внутрь - изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Календулы настойка усиливает действие других противовоспалительных и желчегонных средств (в частности препаратов на основе ромашки и тысячелистника). При одновременном применении с любыми другими лекарственными средствами следует сообщить врачу.

Особые указания

Содержание абсолютного спирта этилового в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе – 0,7 г.

Если при применении препарата симптомы заболевания сохраняются без улучшения или ухудшаются более одной недели при местном и наружном применении препарата и более двух недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Настойка для приема внутрь, местного и наружного применения.

По 25 мл во флаконах темного стекла с винтовой горловиной, укупоренных пробками-капельницами полимерными из полиэтилена высокого давления или пробками полимерными из полиэтилена высокого давления и крышками полимерными навинчиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления, или из смеси полиэтиленов или крышками с капельницей из полиэтилена (крышка) и полипропилена (капельница).

Каждый флакон-капельницу или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д.1

тел. +7 (495) 956-05-71, www.mosfarma.ru