

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Калия перманганат**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Калия перманганат**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Калия перманганат**Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения**Состав***Действующее вещество*

Калия перманганат 3 г, 5 г или 15 г

Описание: темно-фиолетовые или красно-фиолетовые кристаллы, или мелкокристаллический порошок с металлическим блеском.**Фармакотерапевтическая группа:** антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.**Код АТХ:** D08AX06**Фармакологические свойства**

Антисептическое средство. При соприкосновении с органическими веществами выделяет атомарный кислород. Образующийся при восстановлении калия перманганата марганца оксид образует с белками комплексные соединения – альбуминаты (за счет этого калия перманганат в малых концентрациях оказывает вяжущее, а в концентрированных растворах – раздражающее, прижигающее и дубящее действие). Обладает также дезодорирующим эффектом. Эффективен при лечении ожогов и язв.

Способность калия перманганата обезвреживать некоторые яды лежит в основе использования его растворов для промывания желудка при отравлениях.

При попадании внутрь всасывается, оказывая гематотоксическое действие (приводит к развитию метгемоглобинемии). Препарат относится к списку IV прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Показания к применению

Смазывание язвенных и ожоговых поверхностей – инфицированные раны, язвы и ожоги кожи.

Полоскание полости рта и горла – при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и горла (в т. ч. при тонзиллитах, фарингитах).

Для промывания и спринцеваний при гинекологических и урологических заболеваниях – кольпиты и уретриты.

Для промываний: желудка – при отравлениях, вызванных приемом внутрь алкалоидов (морфин, аконитин, никотин), синильной кислотой, фосфором, хинином; кожи – при попадании на нее анилина; глаз – при поражении их ядовитыми насекомыми.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к калия перманганату.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

После консультации с врачом возможно применение препарата, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, в виде водных растворов:

- для промывания инфицированных ран – 0,1-0,5 % раствор ежедневно до полного очищения раны от гнойного отделяемого и появления грануляций (не более 5-7 дней);
- для смазывания (орошения) язвенных и ожоговых поверхностей – 2-5 % раствор ежедневно до полного исчезновения мокнутия в очаге поражения (не более 5-7 дней);
- для промывания и спринцевания при гинекологических и урологических заболеваниях – 0,02-0,1 % раствор ежедневно (не более 5-7 дней);
- для полоскания рта и глотки – 0,01-0,1 % раствор 4-5 раз в день в течение 3-5 дней;
- для промывания желудка при отравлениях алкалоидами, синильной кислотой, фосфором, хинином; кожи – при попадании на нее анилина – 0,01-0,1 % раствор однократно до получения чистых промывных вод.

Приготовление раствора.

Несколько кристаллов помещают в стакан с теплой (40-45 °C) свежeproкипяченной водой и перемешивают.

Следует использовать только свежеприготовленный и процеженный раствор калия перманганата. При приготовлении раствора нужно ориентироваться на насыщенность цвета раствора: для промывания ран, полоскания полости рта и глотки, спринцеваний и промываний в гинекологической и урологической практике, желудка при отравлениях используется слабо-розовый раствор. Для язв и ожогов готовят раствор более концентрированный, доводя до насыщенно-фиолетового цвета.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Аллергические реакции. Калия перманганат в растворах высокой концентрации может вызвать раздражение тканей, при повышенной чувствительности тканей – ожог. При попадании раствора внутрь у людей с пониженной кислотностью желудочного сока приводит к гематотоксическому действию (метгемоглобинемия).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

Резкая боль в полости рта, по ходу пищевода, в животе, рвота, диарея; слизистая оболочка полости рта и глотки – отечная, темно – коричневого, фиолетового цвета, возможен отек гортани, развитие механической асфиксии, ожогового шока, двигательного возбуждения, судорог, явлений паркинсонизма, геморрагического колита, нефропатии, гепатопатии. При пониженной кислотности желудочного сока возможно развитие метгемоглобинемии с выраженным цианозом и одышкой.

Смертельная доза для детей – около 3 г, для взрослых – 0,3-0,5 г/кг.

Лечение

Аскорбиновая кислота (в/в – 30 мл 5 % раствора), цианокобаламин – до 1 мг, пиридоксин (в/м – 3 мл 5 % раствора), метиленовый синий (50 мл 1 % раствора).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При взаимодействии с некоторыми органическими веществами (танин, сахар, уголь, спирт, глицерин, органические кислоты) или легкоокисляющимися веществами (сера, натрия тиосульфат, натрия нитрат, железо восстановленное) может произойти взрыв. При взаимодействии с бромидами, йодидами, хлоридами выделяются свободные галоиды.

Особые указания

Раствор калия перманганата при наружном применении окрашивает кожу в коричневый цвет. При применении в высокой концентрации возможно раздражение кожи. Не допускать попадания препарата в глаза.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

По 3 г, 5 г или 15 г препарата в термосвариваемые пакеты из материала комбинированного: буфлен.

По 3 г, 5 г препарата во флаконы из трубки стеклянной, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления или полимерные из полистирола с крышками из полиэтилена высокого давления.

1, 2, 3, 4, 5 саше или 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Список IV таблицы III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»), 665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.