МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Гемодез-8000
раствор для инфузий

ОАО «Биосинтез», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 110712 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для инфузий. По 200 мл и 400 мл в бутылки стеклянные, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками. Каждую бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 24, 28 бутылок по 200 мл или 12, 15 бутылок по 400 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в ящики из картона гофрированного с прокладками и решетками (для стационаров). По 250 мл или 500 мл в контейнеры полимерные. Каждый контейнер полимерный вместе с инструкцией по применению помещают во вторичный мешок из пленки или в пачку из картона. 24, 28 контейнеров по 250 мл или 12, 15 контейнеров по 500 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в ящики из картона гофрированного (для стационаров).	**Форма выпуска** Раствор для инфузий. По 200 мл и 400 мл в бутылки стеклянные, укупоренные пробками из резины и обжатые алюминиевыми колпачками. Каждую бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 24, 28 бутылок по 200 мл или 12, 15 бутылок по 400 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку – ящики из картона гофрированного с прокладками и решетками. По 250 мл или 500 мл в контейнеры полимерные. Каждый контейнер полимерный вместе с инструкцией по применению помещают во вторичный мешок из пленки или в пачку из картона. 24, 28 контейнеров по 250 мл или 12, 15 контейнеров по 500 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку – ящики из картона гофрированного.

Генеральный директор
ОАО «Биосинтез» О.Ю. Клыгина