МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит® Кальций $Д_3$

таблетки жевательные [мятные]

ОАО «Фармстандарт- УфаВИТА», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «07» декабря 2010 г.

Старая редакция		Новая редакция	
Состав на одну таблетку		**Состав на одну таблетку**	
Активные компоненты:		*Активные компоненты:*	
Кальций	500 мг	Кальций	500 мг
(в виде кальция карбоната)	1,25 г	(в виде кальция карбоната)	1,25 г
Колекальциферол	0,005 мг	Колекальциферол	0,005 мг
(витамин D_3)	(200 МЕ)	(витамин D_3)	(200 МЕ)
(в пересчете на 100 % колекальциферол)		(в пересчете на 100 % колекальциферол)	
в виде гранулята, содержащего колекальциферол, d,l-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал, кальция фосфат (Е 341), воду		в виде гранулята, содержащего колекальциферол, d,l-альфа-токоферол, триглицериды среднецепочечные, сахарозу, камедь акации, кукурузный крахмал,	
Вспомогательные вещества: лактозы			

Старая редакция	Новая редакция
моногидрат (сахар молочный), повидон низкомолекулярный, полисорбат-80 (твин-80), крахмал картофельный, кроскармеллоза натрия, лимонной кислоты моногидрат, аспартам (Е 951), магния стеарат, мяты перечной листьев масло.	кальция фосфат (Е 341), воду *Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат (сахар молочный) 0,3209г, повидон низкомолекулярный 0,0066г, полисорбат-80 (твин-80) 0,0029г, крахмал картофельный 0,0831г, кроскармеллоза натрия 0,0552г, лимонной кислоты моногидрат 0,0033г, аспартам (Е 951) 0,0060г, магния стеарат 0,0160г, мяты перечной листьев масло 0,0060г.
Особые указания Компливит® Кальций $Д_3$ содержит аспартам, который в организме трансформируется в фенилаланин, поэтому препарат не должны принимать больные, страдающие фенилкетонурией. У пожилых людей потребность в кальции составляет 1500 мг/сут, в витамине D_3 – 0,5-1 тыс. МЕ/сут. Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D_3 из других источников.	**Особые указания** Компливит® Кальций $Д_3$ содержит аспартам, который в организме трансформируется в фенилаланин, поэтому препарат не должны принимать больные, страдающие фенилкетонурией. У пожилых людей потребность в кальции составляет 1500 мг/сут, в витамине D_3 – 0,5-1 тыс. МЕ/сут. Во избежание передозировки необходимо учитывать дополнительное поступление витамина D_3 из других источников. Не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» С.В.Барыкин