МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 014892/03- 220517
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Кальциумфолинат-Эбеве

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл

Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ, Германия

Изменение № 6

220517

Дата внесения Изменения «__»_____ 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл. *Первичная упаковка* По 3 мл во флаконы из темного стекла типа I Евр.Ф. вместимостью 3 мл, укупоренные бромбутиловой резиновой пробкой, обжатые алюминиевым колпачком с отверстием для иглы в центре и закрытые предохранительной пластмассовой крышкой. По 100 мл во флаконы из темного стекла типа I Евр.Ф. вместимостью	**Форма выпуска** Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл. *Первичная упаковка* По 3 мл во флаконы из темного стекла типа I Евр.Ф. вместимостью 3 мл, укупоренные бромбутиловой резиновой пробкой, обжатые алюминиевым колпачком с отверстием для иглы в центре и закрытые предохранительной пластмассовой крышкой. По 100 мл во флаконы из темного стекла типа I Евр.Ф. вместимостью

100 мл, укупоренные бромбутиловой резиновой пробкой, обжатые алюминиевым колпачком с отверстием для иглы в центре и закрытые предохранительной пластмассовой крышкой. *Вторичная упаковка* По одному флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	100 мл, укупоренные бромбутиловой резиновой пробкой, обжатые алюминиевым колпачком с отверстием для иглы в центре и закрытые предохранительной пластмассовой крышкой. *Вторичная упаковка* По одному флакону вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. По 5 флаконов вместимостью 3 мл вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с картонным держателем.

Медицинский директор
ЗАО «Сандоз»

Королева М.Г.