ЛП-№(006251)-(РГ-RU) от 19.06.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.07.2024 № 14306
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАМФОРА, МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 10%

Регистрационный номер:

Торговое наименование: КАМФОРА

Международное непатентованное или группировочное наименование: Камфора

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г:

Действующее вещество:

Камфора – 10 г

Вспомогательные вещества:

Вазелин, парафин твердый, ланолин безводный

Описание

Однородная мазь желтого цвета с запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство природного происхождения.

Код АТХ M02AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

При наружном применении оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

Показания к применению

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.07.2024 № 14306
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Артралгия, миалгия, ишиас, миозит, радикулит, профилактика образования пролежней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), склонность к судорожным реакциям, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных о безопасности применения у данной группы пациентов).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно.

Миалгия, миозит, артралгия, радикулит, ишиас: небольшое количество препарата наносят на область болевых ощущений и легкими движениями растирают. Применяют 2-3 раза в день в течении 7-10 дней.

Профилактика образования пролежней: обрабатка кожных покровов 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочные действия

Возможны аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.07.2024 № 14306
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Передозировка

Симптомы: тахикардия, возбуждение, судороги.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания препарата в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций из-за возможного возникновения побочного эффекта – головокружения.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 10 %.

По 25 г, 30 г, 35 г, 40 г в банках оранжевого стекла, укупоренных крышками натягиваемыми пластмассовыми, или в банках оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных крышками навинчиваемыми пластмассовыми, или в банках полимерных с укупорочными средствами, или в тубах алюминиевых.

Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Допускается каждую упаковку комплектовать аппликатором или лопаткой для нанесения мази из полиэтилентерефталата.

Упаковка для стационаров.

По 54 или 70 банок с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку (короб картонный).

По 1 кг, 2 кг или 5 кг в ведрах полиэтиленовых с крышками.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.07.2024 № 14306
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения:

ООО «ДАНСОН-РУ»,

Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом. 1, ком. 220.

Тел.: +7 (495) 580-30-60.

Представитель держателя регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика» (АО «ЯФФ»)

Россия, 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5.

Тел.: (4852) 44-38-56.

Электронная почта: farmfab@yaroslavl.ru