ЛП-№(014134)-(РГ-RU) от 30.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6044
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАМФОРНАЯ МАЗЬ

Регистрационный номер:

Торговое наименование Камфорная мазь

Международное непатентованное или группировочное наименование Камфора

Лекарственная форма Мазь для наружного применения

Состав

Действующее вещество:

Камфора – 10 г

Вспомогательные вещества:

Парафин твердый – 8 г

Ланолин безводный – 28 г

Вазелин – 54 г

Описание Однородная мазь желтого или желто-коричневого цвета с запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ M02AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

При наружном применении оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизмененном виде легкими и с желчью. Проницаемость через гематоэнцефалический и плацентарный барьер – высокая. Секреция с грудным молоком – высокая.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6044
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Показания к применению

Миалгия, миозит, артралгия, ишиас, профилактика образования пролежней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема); беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Способ применения и дозы

Наружно. Небольшое количество мази наносят на область болевых ощущений и легкими движениями растирают 2-3 раза в день. Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день. После применения мази тщательно вымыть руки. Курс лечения 7-10 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочные действия

Аллергические кожные реакции (крапивница); раздражение кожи; головная боль, головокружение. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы – возбуждение, тахикардия, судороги.

Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на открытые раны, слизистые оболочки и в глаза. После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

В состав препарата входит ланолин, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 24.03.2026 № 6044
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций из-за возможного возникновения побочного эффекта – головокружения.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 10 %.

25 г, 50 г в банки темного стекла, укупоренные полиэтиленовыми крышками, натягиваемыми с уплотняющим элементом или навинчиваемыми крышками.

20 г, 25 г, 30 г, 40 г в тубы алюминиевые, укупоренные бушонами полимерными.

64 (или 49, или 36) банки по 25 г, 50 г с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку из картона.

1 банку, тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку, изготовленную из картона.

1 банку, тубу помещают в пачку, изготовленную из картона, на которую нанесен полный текст инструкции по применению.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/ Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии от потребителей

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д.2

Тел./ факс (4822) 44-41-19