ЛП-№(014833)-(РГ-RU) от 12.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.05.2026 № 9154
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КАМФОРНОЕ МАСЛО

Регистрационный номер:

Торговое наименование Камфорное масло

Международное непатентованное или группировочное наименование Камфора

Лекарственная форма раствор для наружного применения масляный

Состав

Действующее вещество:

Камфора (камфора синтетическая) - 10 г

Вспомогательное вещество:

Масло подсолнечное - до 100 мл

Описание Прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета с запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления связываются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде дыхательными путями и с желчью.

Показания к применению

Артралгия, миалгия, ишиас, миозит, радикулит, профилактика развития пролежней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, склонность к судорожным реакциям, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема), беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.05.2026 № 9154
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно. Небольшое количество масла наносят на кожу в области болевых ощущений и легкими движениями растирают 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 7-10 дней. Для профилактики образования пролежней обрабатывают кожу 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Следует избегать попаданий препарата на открытые раны, в глаза и слизистые оболочки.

После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами) из-за возможного побочного эффекта - головокружения.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения масляный, 10 %.

30 мл, 50 мл или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и навинчиваемыми крышками.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.05.2026 № 9154
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

49 или 36 флаконов по 30 мл, 50 мл; 16 (или 24, или 25) флаконов по 100 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку. Флаконы отделяют друг от друга прокладками из картона (для стационаров).

1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

1 флакон помещают в пачку из картона, на которую нанесен полный текст инструкции по применению.

Пачки помещают в групповую упаковку.

4.5 л, 10 л, 11.5 л, 19 л, 21.5 л, 26.5 л, 28 л, 31.5 л для производственных отделов аптек в канистры, изготовленные из полиэтилена низкого давления, укупоренные герметичными крышками.

На флакон, канистру наклеивают этикетку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ^{0}С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Предприятие-производитель/ Организация, принимающая претензии

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2

Тел./факс (4822) 44-41-19.