ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КАМФОРНЫЙ СПИРТ

Регистрационный номер:

Торговое название: Камфорный спирт

Международное непатентованное или группировочное название: камфора

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 мл:
активные вещества: камфора 10 г
вспомогательные вещества: этанол (этиловый спирт) 70 % до 100 мл

Описание: прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа: местноанестезирующее средство природного происхождения
Код АТХ: [M02AX10]

Фармакологическое действие
Лекарственное средство природного происхождения, оказывает местнораздражающее, антисептическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Возбуждает чувствительные нервные окончания, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика
При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизмененном виде легкими и желчью.

Показания
Миалгия, миозит, артралгия, ишиас, профилактика образования пролежней.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания

кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), беременность, период лактации, детский возраст (в связи с отсутствием данных).

Способ применения и дозы
Наружно. Миалгия, миозит, артралгия, ишиас: наносят на кожу над пораженной областью 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 7-10 суток.
Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день.

Побочные действия
Аллергические реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

Передозировка
Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги.
Лечение: симптоматическое.

Форма выпуска
Раствор для наружного применения спиртовой 10%.
По 40 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми с уплотнительными элементами и навинчиваемыми крышками.
Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается упаковка флаконов без пачки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению в групповую упаковку.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:
ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»
300004, г. Тула, Торховский проезд, дом 10. Тел/факс: 8 (4872) 41-04-73

Директор ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» _____ Благовещенская Н.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. Тула «Тульская фармацевтическая фабрика» Общество с ограниченной ответственностью

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9