ЛП-№(008982)-(РГ-RU) от 21.02.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 3995
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Масло камфорное

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Масло камфорное

Международное непатентованное или группировочное наименование: Камфора

Лекарственная форма: раствор для наружного применения масляный.

Состав

Действующее вещество:

Камфоры - 100 г.

Вспомогательное вещество:

Масла подсолнечного рафинированного - до 1 л.

Описание

Прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета с запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ M02AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждает чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Фармакокинетика

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается, подвергается окислению. Продукты окисления связываются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

Показания к применению

Артралгия, миалгия, ишиас, миозит, радикулит, профилактика образования пролежней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, склонность к судорожным реакциям, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 3995
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно.

Миалгия, миозит, артралгия, радикулит, ишиас: небольшое количество препарата наносят на кожу в области болевых ощущений и легкими движениями растирают. Применяют 2-3 раза в день в течение 7-10 дней.

Профилактика образования пролежней: обработка кожных покровов 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

В отдельных случаях возможно возникновение аллергических кожных реакций (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания препарата на открытые раны, в глаза и слизистые оболочки. В случае попадания препарата в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций из-за возможного возникновения побочного эффекта – головокружения.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения масляный 10 %.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2025 № 3995
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

По 30, 50 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками из полиэтилена высокого или низкого давления с уплотнительными элементами и крышками из полиэтилена высокого или низкого давления навинчиваемыми, или по 30, 50 мл во флаконы из полиэтилена высокого давления нестабилизированного и неокрашенного или из полиэтилена низкого давления, укупоренные навинчиваемыми крышками с пробками из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 30, 50 мл во флаконы из полиэтилена высокого или низкого давления или полиэтилентерефталата, укупоренные пробками из полиэтилена высокого или низкого давления, или пробками с уплотнительными элементами из полиэтилена высокого или низкого давления и крышками из полиэтилена высокого или низкого давления или полипропилена, или укупоренные крышками из полиэтилена высокого или низкого давления или полипропилена.

Каждый флакон по 30 мл и 50 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается выпуск препарата во флаконах вместимостью по 30 мл по 30 штук, 40 штук, 50 штук, 96 штук и вместимостью по 50 мл по 30 штук, 40 штук, 50 штук, 70 штук, 94 штуки без пачки картонной с инструкциями по применению, приложенными в количестве, равном количеству флаконов в гофрокоробки, или упаковывают в термоусадочную пленку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ˚С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «ВЕСТ», Россия, 117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 25, офис 5 этаж.

Производитель

ОАО «Самарамедпром», Россия, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии потребителей

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.