ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ДОКТОР МОМ ® ИНХАЙЛЕР

Регистрационный номер:

Торговое название: ДОКТОР МОМ ® ИНХАЙЛЕР

Лекарственная форма: Карандаш для ингаляций

Состав

Активные вещества:

Камфора	207,70 мг
Левоментол	207,70 мг
Метилсалицилат	61,35 мг

Вспомогательные вещества: жидкий парафин

Описание: Цилиндрический, перфорированный у основания и снабженный ингаляционным отверстием в верхней части пенал с завинчивающимся колпачком, содержащий цилиндрический тампон из волокнистой ацетат вискозы, пропитанной смесью лекарственных веществ со специфическим запахом и обернутой вощеной бумагой.

Фармакотерапевтическая группа: местнораздражающее средство.

Код АТХ: R05X.

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено составом входящих в него компонентов.

Камфора оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Левоментол обладает местнораздражающим, обезболивающим, отвлекающим, противозудным и антисептическим действием. Антисептическая активность проявляется неизбирательным поражением микробных клеток. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует понижению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, переходящим в ощущение легкого жжения и покалывания.

Метилсалицилат обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием. Нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей.

Показания

Симптоматическая терапия воспалительных заболеваний дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит) для облегчения носового дыхания при лечении острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком, чувством заложенности носа.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата; бронхиальная астма, бронхоспазм; коклюш; детский возраст до 6 лет; беременность и период лактации.

Способ применения и дозы

Местно. Детям от 6 до 11 лет: по 1 вдоху в каждое носовое отверстие каждые 2 часа.

Детям старше 12 лет и взрослым: по 2 вдоха в каждое носовое отверстие каждые 2 часа.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, контактная экзема, бронхоспазм, появление ощущения жжения, чихания или усиления заложенности носа.

Передозировка

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Взаимодействие

Данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами нет.

Особые указания

Не следует превышать рекомендованные дозы. Не следует использовать один карандаш более чем у одного человека: это может привести к распространению инфекции. Не применять более 3 дней. Частое и продолжительное применение препарата может привести к усилению заложенности носа.

Форма выпуска

Карандаш для ингаляций.

Цилиндрический, перфорированный у основания и снабженный ингаляционным отверстием в верхней части пенал из полиэтилена высокой плотности с завинчивающимся колпачком.

1 пенал помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Отпускается из аптек без рецепта

Производится фирмой

«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
(Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс
энд Фармасьютикалс Лтд.»)
Ворли, Мумбай 400 030, Индия

Представительство в России:

Москва, 123242, ул. Садовая Кудринская, 3,
тел. (495) 254-7579, факс: (495) 254-8382

И.О. Директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель фирмы О.В. Некрасова