ЛП-№(010617)-(РГ-RU) от 19.06.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.06.2025 № 14968
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭВАМЕНОЛ® АКТИВ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ЭВАМЕНОЛ® АКТИВ

Международное непатентованное или группировочное наименование: Камфора+Левоментол/Мяты перечной листьев масло+ Эвкалипта прутовидного листьев масло

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав на 100 г:

Действующие вещества:		
Левоментол (L-ментол)	18 г	-
Мяты перечной листьев масло (Мяты перечной масло) (с содержанием L-ментола 70%)	-	25,75 г
Камфора (Камфора синтетическая)	10 г	10 г
Эвкалипта прутовидного листьев масло (Эвкалиптовое масло)	10 г	10 г
Вспомогательные вещества:		
Гвоздичное масло	1 г	1 г
Парафин твердый	26 г	30,5 г
Вазелин	до 100 г	до 100 г

Описание

Однородная мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологическое действие

Комбинированное средство природного происхождения. Действие обусловлено рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.06.2025 № 14968
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

кожи и подкожных образований. Оказывает местнораздражающее («отвлекающее»), легкое местнообезболивающее действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Препарат ЭВАМЕНОЛ ® АКТИВ показан к применению у взрослых пациентов и у детей в возрасте от 12 лет до 18 лет в качестве «отвлекающего», местнообезболивающего средства при невралгии, миалгии, артралгии, миозите.

Противопоказания

Гиперчувствительность к левоментолу, мяты перечной листьев маслу, камфоре, эвкалипта прутовидного листьев маслу, растениям семейства миртовых или к любому из вспомогательных веществ, дерматологические заболевания, нарушения целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата, эпилепсия, судороги в анамнезе, склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Полоску мази длиной 2-4 см следует нанести на болезненную область и втереть в кожу легкими массажными движениями. Процедуру проводить в зависимости от интенсивности болевых ощущений 2 - 3 раза в день. Курс лечения до 14 дней.

Режим дозирования у детей в возрасте от 12 лет до 18 лет соответствует режиму дозирования у взрослых. Эффективность и безопасность у детей в возрасте от 0 до 12 лет на настоящий момент не установлены. Данные отсутствуют.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (эритема, кожная сыпь, шелушение кожи, кожный зуд, крапивница, контактный дерматит, бронхоспазм), жжение, покалывание, ощущение холо-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.06.2025 № 14968
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

да в местах аппликации мази. В связи с содержанием в составе препарата камфоры возможно возникновение головной боли, головокружения, судорог.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Передозировка при наружном применении маловероятна, при этом возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Симптомы передозировки при случайном приеме мази внутрь: изжога, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головная боль, головокружение, брадикардия, снижение артериального давления, ощущение жара, «приливы» крови к лицу, судороги, угнетение дыхания, мышечная слабость, дезориентация, спутанность сознания, кома.

Лечение:

В случае приема мази внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.

Лечение симптоматическое и поддерживающее: коррекция электролитного и водного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела; в тяжелых случаях – переливание крови, гемодиализ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано. Не рекомендуется применять препарат одновременно с другими средствами для наружного применения.

В связи с низкой системной абсорбцией мази ЭВАМЕНОЛ®АКТИВ риск развития лекарственных взаимодействий невысок. Тем не менее, следует помнить, что входящие в состав препарата терпеновые компоненты являются индукторами микросомальных ферментов печени, метаболизирующих другие лекарственные средства. Поэтому существует вероятность ослабления эффекта других лекарственных средств, применяемых совместно с мазью ЭВАМЕНОЛ®АКТИВ. При одновременном применении с нестероидными противовоспалительными препаратами для местного применения ЭВАМЕНОЛ®АКТИВ усиливает их эффект и увеличивает глубину проникновения в мягкие ткани в зоне аппликации. Диметилсульфоксид при одновременной аппликации с мазью ЭВАМЕНОЛ®АКТИВ усиливает системную абсорбцию входящих в его состав компонентов эфирных масел и увеличивает глубину проникновения в мягкие ткани в зоне аппликации. Не рекомендуется применять препарат одновременно с другими средствами для наружного применения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.06.2025 № 14968
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения! Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой и обратиться к врачу. Мазь наносить только на чистую неповрежденную кожу. После нанесения мази не рекомендуется применять местное тепло в связи с повышением риска возникновения кожных реакций.

После применения мази следует тщательно вымыть руки водой с мылом (если они не являются объектом лечения).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Пациенты должны быть предупреждены о возможности развития головокружения и появления судорог при применении препарата. При появлении описанных нежелательных явлений следует воздержаться от выполнения указанных видов деятельности.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 30 г в алюминиевые тубы с бушонами. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д.1

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.06.2025 № 14968
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

тел. +7 (495) 956-05-71

www.mosfarma.ru