

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ПЕРКАМФ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 008698-121222
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер

Торговое наименование Перкамф

Международное непатентованное или группировочное наименование
Камфора + Перца стручкового плодов настойка

Лекарственная форма
Раствор для наружного применения спиртовой.

Состав
Состав на 100 мл:

Камфорный спирт 10 % - 50 мл
Перца стручкового плодов настойка - 50 мл

Описание
Прозрачная красновато-коричневая жидкость с характерным запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа
Местнораздражающее средство растительного происхождения.

Код АТХ M02AB

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат растительного происхождения оказывает местнораздражающее, противовоспалительное и анальгетическое действие. Фармакологические свойства препарата обусловлены входящими в состав компонентами: алкалоидом капсаицином и камфорой. Наличие капсаицина выражается местным раздражающим, отвлекающим и разогревающим действием, вызывая усиление местного кровотока в коже, воздействуя на болезненные процессы, локализованные также и в глубине тканей. Камфора возбуждает чувствительные нервные окончания, рефлекторно улучшает трофику органов и тканей.

Показания к применению
Невралгия, пояснично-крестцовый радикулит, деформирующий остеоартроз, миозит, артралгия, артрит, миалгия, люмбаго, ишиалгия.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема); склонность к судорожным реакциям, беременность, период лактации.

С осторожностью
Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано, т.к. данные отсутствуют.

Способ применения и дозы

Наружно, для растираний: наносят на кожу над пораженной областью 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 7-10 суток.

Побочное действие

Сильное жжение, аллергические реакции (крапивница, раздражение кожи).

Передозировка

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. После применения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос следует тщательно промыть их водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата в соответствии с инструкцией не влияет на управление автотранспортом и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой. По 100 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ, укупоренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления, или полиэтилентерефталата с уплотнительным элементом, или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления;

или по 100 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных колпачками винтовыми с распылителем, или укупоренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата с уплотнительным элементом с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укупоренных крышками из полиэтилена с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом; или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укупоренных крышками из полиэтилена с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом.

Каждый флакон/флакон-капельницу помещают в пачку картонную.

Инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата вкладывают в пачку картонную или наносят на пачку картонную.

Упаковка для стационаров. От 9 до 300 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения, производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Россия, 150030 г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5, тел/факс (4852) 44-38-56

Директор ЗАО «ЯФФ»



С.П. Аتماшкин