

МИНЗДРАВ РОССИИ

21.05.2024

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Перкамф

раствор для наружного применения спиртовой

Закрытое акционерное общество
«Ярославская фармацевтическая фабрика», Россия

Изменение № 1

21.05.2024

Дата внесения Изменения

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для наружного применения спиртовой. По 100 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ, укупоренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления, или полиэтилентерефталата с уплотнительным элементом, или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата, или смеси полиэтилена вы-	Форма выпуска Раствор для наружного применения спиртовой. По 100 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ, укупоренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления, или полиэтилентерефталата с уплотнительным элементом, или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления;

Старая редакция	Новая редакция
сокого давления и полиэтилена низкого давления; или по 100 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных колпачками винтовыми с распылителем, или укупоренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата с уплотнительным элементом с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укупоренных крышками из полиэтилена с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом; или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укупоренных крышками из полиэтилена с отрывным кольцом контроля первого	или по 100 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных колпачками винтовыми с распылителем, или укупоренных крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата с уплотнительным элементом с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укупоренных крышками из полиэтилена с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом; или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтилентерефталата с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия, или укупоренных крышками из полиэтилена с отрывным кольцом контроля первого вскрытия и запорным конусом. Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картон-

Старая редакция	Новая редакция
вскрытия и запорным конусом. Каждый флакон/флакон-капельницу помещают в пачку картонную. Инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата вкладывают в пачку картонную или наносят на пачку картонную. <i>Упаковка для стационаров.</i> От 9 до 300 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку.	ную. <i>Упаковка для стационаров.</i> От 9 до 300 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку.

Директор ЗАО «ЯФФ»



С.П. Атмашкин