ЛП-№(013944)-(РГ-RU) от 16.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Алвипсал

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Алвипсал

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Камфора + Салициловая кислота + Скипидар живичный + Яд гадюки.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Состав на 1 г мази

Действующие вещества: яд гадюки − 0,05 МЕД (мышиных единиц действия), салициловая кислота − 10,0 мг, камфора − 30,0 мг, скипидар живичный − 30,0 мг.

Вспомогательные вещества: натрия хлорид – 0,72 мг, эмульгатор № 1 − 80,0 мг, парафины твердые − 30,0 мг, вазелин − 70,0 мг, глицерол (глицерин) − 20,0 мг, вода очищенная − до 1 г.

Описание

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры и скипидара.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: MO2AX10.

Фармакологические свойства

Болеутоляющая мазь с ядом гадюки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей. Оказывает местное раздражающее и анальгезирующее действие.

Показания к применению

Применяется наружно у взрослых и детей старше 12 лет.

Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сопровождающиеся болевым синдромом (в т. ч. артралгии, невралгии, миалгии, ишиас, радикулит).

Противопоказания

Гиперчувствительность, кожные заболевания (в том числе аллергического и бактериального генеза), активный туберкулез легких, лихорадочные состояния, общее истощение, тяжелая недостаточность мозгового и коронарного кровообращения, непереносимость салицилатов, склонность к ангиоспазмам, тяжелая печеночная и почечная недостаточность.

Детский возраст до 12 лет.

Беременность и период кормления грудью.

С осторожностью

Детский возраст от 12 до 18 лет (необходимость применения препарата у детей определяется врачом индивидуально). Указания в анамнезе на бронхиальную астму, спровоцированную приемом ацетилсалициловой кислоты или иными нестероидными противовоспалительными препаратами.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Противопоказано применение препарата во время беременности.

Лактация

Противопоказано применение препарата во время грудного вскармливания.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фертильность

Влияние мази Алвипсал на фертильность не изучалось, поэтому женщинам с детородным потенциалом следует использовать эффективные методы контрацепции в период лечения мазью Алвипсал.

Способ применения и дозы

Наружно.

В зависимости от величины области болезненного участка наносят маленькими порциями 5−10 г (1−2 чайные ложки) мази и втирают в кожу в зависимости от интенсивности боли 1−2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома.

Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания. При сохранении симптомов болезни после 14-дневного лечения проконсультируйтесь с врачом.

Дети

Дети в возрасте от 12 до 18 лет

Необходимость применения препарата у детей в возрасте от 12 до 18 лет определяется врачом индивидуально.

Режим дозирования для детей в возрасте от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Дети до 12 лет

Алвипсал противопоказан у детей в возрасте от 0 до 12 лет.

Побочное действие

Частота возникновения нежелательных реакций определялась в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, но < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000, но < 1/100), редко (≥ 1/10 000, но < 1/1 000), очень редко (< 1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Общие нарушения и реакции в месте введения

Частота неизвестна: при повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек или крапивница.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу.

При случайном попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное раздражение.

После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой.

Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу.

Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат Алвипсал не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 30 г в тубы алюминиевые с мембраной, бушонами из полиэтилена низкого давления. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ^{o}C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2026 № 4940
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948

Факс +7 (3854) 326-943

Эл. почта: office@altayvitamin.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Тел.: +7 (3854) 337-514

Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88

Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru