ЛП-№(012560)-(РГ-RU) от 24.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.11.2025 № 28815
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

САЛВИСАР®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: САЛВИСАР®

Международное непатентованное или группировочное наименование: камфора + салициловая кислота + скипидар живичный + яд гадюки.

Состав

на 100 г мази:

Действующие вещества:

яд гадюки – 5 мышиных единиц действия (МЕД), салициловая кислота – 1 г, камфора синтетическая – 3 г, скипидар живичный – 3 г;

Вспомогательные вещества: эмульгатор № 1 (Ланетте SX) – 8 г, парафины нефтяные твердые – 3 г, вазелин – 7 г, глицерол (глицерин) – 2 г, натрия хлорид – 0,072 г, вода очищенная – до 100 г.

Описание: мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с характерным запахом. Должна быть однородной, допускается включение пузырьков.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Обладает местным раздражающим и обезболивающим действием. Нейротропный компонент змеиного яда, входящий в состав, оказывает анальгетическое действие; энзиматический компонент с гиалуронидазной активностью ускоряет процесс заживления. Вызывает раздражение

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.11.2025 № 28815
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 000)

чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей.

Показания к применению

Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сопровождающиеся болевым синдромом: артрит различной этиологии, артралгии, невралгии, миалгии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кожные заболевания (в т.ч. аллергического и бактериального генеза), нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата), активный туберкулез легких, лихорадочные состояния, общее истощение, тяжелая недостаточность мозгового и коронарного кровообращения, склонность к ангиоспазмам, тяжелая печеночная или почечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, непереносимость салицилатов, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Детский возраст от 12 до 18 лет (необходимость применения препарата у детей определяется врачом индивидуально). Указания в анамнезе на бронхиальную астму, спровоцированную приемом ацетилсалициловой кислоты или иными нестероидными противовоспалительными препаратами.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно, по 5–10 г (1–2 ч. ложки) мази по частям наносят на область болезненных участков и втирают в кожу 1 раз в сутки, при сильных болях – 2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома, но не более 10 дней без консультации врача.

Побочное действие

Ощущение жжения, возникающее в процессе втирания, обычно проходит через

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.11.2025 № 28815

несколько минут. В единичных случаях – кожные аллергические реакции (зуд, отек, крапивница).

Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

Передозировка

При применении препарата в рекомендуемой дозе о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, в связи с чем совместное применение с другими препаратами локального действия может приводить к усилению их всасывания. Использование больших количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект гипогликемических средств. Не использовать препарат с пероральными антикоагулянтами.

Особые указания

После применения препарата необходимо тщательно мыть руки. Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и на поврежденную кожу. При попадании мази в глаза или на слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством воды.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 15 г, 25 г, 40 г, 50 г, 75 г и 100 г в тубу из комбинированного материала с

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.11.2025 № 28815
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

бушоном для упаковывания лекарственных средств или алюминиевую с внутренним покрытием лаком с бушоном из полиэтилена низкого давления или высокого давления, или в тубу алюминиевую.

Одну тубу или две тубы по 25 г вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «ПРОМОМЕД РУС», Российская Федерация

129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13

Производитель

АО «Биохимик», Российская Федерация

Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15А

Адрес места производства: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15А

Телефон: +7 (8342) 38-03-68

Адрес электронной почты: biohimic@promomed.pro

Адрес в сети интернет: promomed.ru

АО «Татхимфармпрепараты», Российская Федерация

Юридический адрес: 420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Адрес места производства: 420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

Телефон: 8-800-201-98-88

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.11.2025 № 28815
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Телефон/факс: +7 (843) 571-85-58

Адрес электронной почты: marketing@tatpharm.ru

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «ПРОМОМЕД РУС», Российская Федерация

129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13

Телефон: 8 800 222 95 63; 8 800 777 86 04 (круглосуточно)

Электронная почта: hot_line@promomed.pro