МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000097- 080217
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом

Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование: Камфора + Скипидар живичный + Эвкалипта прутовидного листьев масло + [Левоментол]

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав (на 100 г мази)

Активные вещества - левоментол 2,75 г, камфора 5,00 г, эвкалиптовое масло 1,50 г, терпентиновое масло 5,00 г; *вспомогательные вещества* - тимол 0,25 г, кедровое масло 0,45 г, парафин белый мягкий до 100 г.

Описание: мазь от белого до желтовато-белого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: местнораздражающее средство природного происхождения.

Код АТХ: R05X

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Оказывает местнораздражающее, противовоспалительное и антисептическое действие. Снижение степени заложенности носа при однократном нанесении препарата наблюдается до 8 часов.

Фармакокинетика

Препарат оказывает местное действие. Компоненты препарата практически не всасываются.

Показания к применению

Для симптоматического лечения в составе комплексной терапии катарального ринита, заложенности носа, боли в горле и кашля, возникшего на фоне простудных заболеваний. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, склонность к ларинго- и бронхоспазму, бронхиальная астма, коклюш, ложный круп (острый стенозирующий ларинготрахеит), кашель, вызванный скоплением мокроты (слизи), продолжительный или хро-

нический кашель, вызванный курением или эмфиземой, повреждения кожных покровов и кожные заболевания в области предполагаемого нанесения препарата, беременность, детский возраст до 2 лет.

С осторожностью

Период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин применение препарата у беременных женщин противопоказано. В случае применения препарата в период грудного вскармливания следует прекратить грудное вскармливание на период применения препарата. В период лактации не следует наносить мазь на кожу груди кормящей матери, ввиду возможного риска развития апноэ у младенца вследствие контакта ребёнка с областью нанесения мази.

Способ применения и дозы

Наружное применение (растирание). Только для взрослых и детей старше 2 лет.

Втирать мазь легкими движениями 2-4 раза в день в кожу груди при насморке и заложенности носа; в кожу шеи при кашле и боли в горле; в кожу спины при кашле. Продолжительность лечения в среднем до 5 дней.

Препарат предназначен только для наружного применения. Если после лечения улучшение не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Вы должны обратиться к врачу, если симптомы ухудшаются или не улучшаются после 2-3 дней лечения.

Побочное действие

Покраснение кожи, раздражение кожи в области нанесения препарата, аллергический дерматит, слезотечение.

Нежелательные реакции наблюдаются редко и обычно незначительно выражены.

При применении лекарственного препарата в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции по применению, системное действие препарата практически отсутствует.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

В целях получения новых сведений по безопасности препарата, медицинским работникам рекомендуется сообщать о каждом случае нежелательной реакции, возникшей на фоне применения препарата Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом. Это позволяет постоянно контролировать соотношение польза/риск лекарственного препарата.

Передозировка

Симптомы: раздражение кожи в местах нанесения препарата, бронхоспазм, ларингоспазм.

Лечение: избыточное количество мази может быть удалено с помощью марлевой или бумажной салфетки, смоченной растительным маслом. При бронхо- или ларингоспазме необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Проглатывание мази может вызвать такие желудочно-кишечные симптомы, как рвота и диарея. При возникновении вышеописанных симптомов может потребоваться симптоматическая терапия.

Случайное проглатывание существенного количества мази может вызвать острое отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, болью в животе и головной болью, головокружением, приступами жара/покраснением кожных покровов, судорогами, удушьем и комой.

При случайном проглатывании препарата необходимо немедленно обратиться к врачу. Не следует вызывать рвоту.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучено.

Особые указания

Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Не наносить препарат на повреждённую или раздражённую кожу, раны или слизистые оболочки. Не проглатывать. Не наносить на кожу в области носа. Избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки полости рта или кожу лица. Препарат предназначен только для наружного применения. При случайном попадании мази в глаза и на слизистые оболочки рекомендуется обильное промывание водой.

Никогда не нагревать препарат и не применять его в нагретом состоянии.

После растирания, одежда, покрывающая область нанесения препарата, не должна быть сильно затянута.

Если самочувствие не улучшается или становится хуже, необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 25, 50 и 100 г в банку из полипропилена с крышкой из полипропилена. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия

125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2

Производитель

Проктер энд Гэмбл Мануфэкчуринг ГмбХ, Германия

Зульцбахер штрассе 40-50, D-65824 Швальбах ам Таунус

Адрес места производства

Проктер энд Гэмбл Штрассе 1, D-64521 Гросс-Герау, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Проктер энд Гэмбл», Россия

125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2. Тел. 8-800-200-20-20

Менеджер по регистрации И.В. Тымковская