ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Каметон, аэрозоль для местного применения

Регистрационный номер: ЛС-002052

Изменение № 1

Срок введения изменений с «14» 01 2009г

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Распыляют в ротовую полость и носовые ходы (снимают предохранительный колпачок с распылителя и, введя его в полость рта или носа, нажимают на его основание в течение 1-2 сек). В течение суток ингаляции повторяют 3-4 раза.	**Способ применения и дозы** Распыляют в ротовую полость и носовые ходы (снимают предохранительный колпачок с распылителя и, введя его в полость рта или носа, нажимают на его основание в течение 1-2 секунд). В течение суток ингаляции повторяют 3-4 раза. **Во время введения препарата баллон следует держать распылителем вверх!**
Производитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18 Тел./Факс: (07122) 6-14-65	**Производитель** ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия, 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18 Тел./Факс: (4712) 34-03-14

Представитель
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Е.В. Толстова

«24» 11 2008 г.