ЛС-002052 от 07.12.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.12.2023 № 25411
(Входящий МЗ №4269748)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Каметон

аэрозоль для местного применения

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"



(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

Изменение № 8

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Распыляют в ротовую полость и носовые ходы (снимают предохранительный колпачок с распылителя и, введя его в полость рта или носа, нажимают на его основание в течение 1–2 секунд). В течение суток ингаляции повторяют 3 – 4 раза. **Во время введения препарата баллон следует держать распылителем вверх!** **Форма выпуска** Аэрозоль для местного применения. По 30 г или 45 г в баллонах аэрозольных алюминиевых, снабженных клапанами дозирующего действия, распылителями и защитными колпачками.	**Способ применения и дозы** Препарат распыляют в ротовую полость и носовые ходы. Снимают предохранительный колпачок с вертикального распылителя, вводят в полость рта или носа и нажимают на его основание в течение 1 – 2 секунд. При необходимости вертикальный распылитель заменяют на горизонтальный. В течение суток ингаляции повторяют 3 – 4 раза. <u>Смена насадки распылителя</u> 1. Необходимо снять вертикальный распылитель, удерживая баллон (см. рис. 1).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.12.2023 № 25411
(Входящий МЗ №4269748)

Старая редакция	Новая редакция
Каждый баллон с распылителем, защитным колпачком и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	 2. Надеть горизонтальный распылитель, удерживая баллон и направив его в сторону от себя (см. рис.2).  **Во время распыления препарата в ротовую полость и носовые ходы баллон следует держать вертикально. Не переворачивать!** **Форма выпуска** Аэрозоль для местного применения. По 30 г или 45 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные дозирующими клапанами и вертикальным распылителем с защитным колпачком. На баллон наносят тест этикетки методом трафаретной или сухой офсетной печати или наклеивают самоклеящуюся этикетку.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 01.12.2023 № 25411
(Входящий МЗ №4269748)

Старая редакция	Новая редакция
	По одному баллону аэрозольному, снабженному клапаном дозирующего действия и вертикальным распылителем с защитным колпачком или по одному баллону аэрозольному, снабженному клапаном дозирующего действия и вертикальным распылителем с защитным колпачком, в комплекте с горизонтальным распылителем, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Назарова Н.Е.