МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000557- 111217
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КЛЕОЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Клеол

Международное непатентованное или группировочное наименование: канифоль сосновая

Лекарственная форма: клей для наружного применения

Состав 100 г клея содержат:

Действующее вещество: канифоль сосновая 45,0 г

Вспомогательные вещества: спирт этиловый 95 % (этанол) 37,0 г, эфир диэтиловый 17,0 г, масло подсолнечное 1,0 г.

Описание

Прозрачная, густоватая, клейкая жидкость желтовато - или красновато-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: D08A

Фармакологические свойства

Клеол обладает ранозаживляющим и антисептическим действием. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких кожных ран вследствие образования на их поверхности изолирующей пленки. Пленка эластична и устойчива к механическим и химическим воздействиям.

Показания к применению

Клеол применяется для обработки микротравм - ссадин, царапин, порезов.

Для фиксации повязок.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до одного года.

Применение при беременности н в период грудного вскармливания

Возможно применение лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Наружно.

Для обработки микротравм, перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнений. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и подсушивают место, подлежащее покрытию клеем. Используя тюбик, препарат наносят тонким, равномерным слоем непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения целостности пленки поверх нее наносят новую пленку. Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается на коже.

При необходимости удалить пленку, используйте детское масло. Покройте клей, который необходимо снять маслом. Подождите несколько минут. Промойте это место при помощи мыла и теплой воды. Если необходимо, повторите процедуру несколько раз.

Для фиксации повязок Клеол наносят тонким слоем на кожу вокруг уложенного перевязочного материала и, как только начнет тускнеть блеск клея, поверх повязки укладывают растянутую марлевую салфетку, которая прочно приклеивается к коже.

Побочное действие

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При указанном способе применения практически невозможна. О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Специальные исследования взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применения препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Клей для наружного применения.

По 10 г, 180 г препарата в тубы алюминиевые с навинченными пластмассовыми колпачками. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из

картона.

По 15 г, 30 г препарата во флаконы оранжевого или бесцветного стекла, укупоренные колпачками с перфорацией или пластмассовыми крышками навинчиваемыми. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Для стационаров: по 0,45 кг, 0,9 кг во флаконы, укупоренные крышками навинчиваемыми, или в бутылки с крышками навинчиваемыми полиэтиленовыми с уплотняющими прокладками. Флаконы и бутылки вместе с инструкцией по применению помещают в ящик из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 25^0 С, вдали от источников нагрева и открытого огня.

В недоступном для детей месте!

Срок годности

5 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель

ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Заводская, д. 31

Тел/факс: (495) 522-53-11 (495) 522-97-44

Организация, принимающая претензии

ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Заводская, д. 31

Тел/факс: (495) 522-53-11 (495) 522-97-44

Генеральный директор
ПХФК ОАО «Медхимпром» М.А. Шибаев