

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Каптоприл-САР®**таблетки 25 мг**

АО «Биохимик», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «__» 16 09 19 20__ г.



Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания • Повышенная чувствительность к каптоприлу, любому другому компоненту препарата или другим ингибиторам АПФ. • Ангioneвротический отек в анамнезе, связанный с приемом ингибиторов АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек. • Тяжелые нарушения функции печени и/или почек. • Двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией. • Рефрактерная гиперкалиемия. • Состояние после	Противопоказания • Повышенная чувствительность к каптоприлу, любому другому компоненту препарата или другим ингибиторам АПФ. • Ангioneвротический отек в анамнезе, связанный с приемом ингибиторов АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек. • Тяжелые нарушения функции печени и/или почек. • Двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией. • Рефрактерная гиперкалиемия. • Состояние после

Старая редакция	Новая редакция
трансплантации почки. - Аортальный или митральный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия (состояния, затрудняющие отток крови из левого желудочка). - Одновременное применение с алискиреном и препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или умеренными, или тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м² площади поверхности тела). - Одновременное применение с антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА II) у пациентов с диабетической нефропатией. - Беременность. - Период грудного вскармливания. - Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).	трансплантации почки. - Аортальный или митральный стеноз; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия (состояния, затрудняющие отток крови из левого желудочка). - Одновременное применение с алискиреном и препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или умеренными, или тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м² площади поверхности тела). - Одновременное применение с антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА II) у пациентов с диабетической нефропатией. - Одновременное применение с ингибиторами нейтральной эндопептидазы (например, с препаратами, содержащими сакубитрил) в связи с высоким риском развития ангионевротического отека. - Беременность. - Период грудного вскармливания.

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	• Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Условия хранения В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

/ Генеральный директор
ООО «УК «ПРОМОМЕД»

М.В. Пенькова



121163