

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Карбоцистеин-Тева**
сироп 20 мг/мл, 50 мг/мл

АО «ВЕРТЕКС», Россия


Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл сиропа содержит: <u>Дозировка 20 мг/мл</u> <i>действующее вещество:</i> карбоцистеин – 20,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> сахароза – 700,0 мг, ароматизатор «Клубника с натуральным экстрактом RX9711» – 1,0 мг, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) – 1,5 мг, натрия гидроксид – до pH 6,10 – 6,30, вода очищенная – до 1,0 мл. <u>Дозировка 50 мг/мл</u> <i>действующее вещество:</i> карбоцистеин – 50,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> сахароза – 400,0 мг, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) – 1,5 мг, натрия гидроксид – до pH 6,10 – 6,30, вода очищенная – до 1,0 мл. Описание Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом клубники (дозировка 20 мг/мл). Прозрачная бесцветная или от светло-желтого до желтого цвета жидкость со слабым характерным запахом (дозировка 50 мг/мл).	Состав 1 мл сиропа содержит: <u>Дозировка 20 мг/мл</u> <i>действующее вещество:</i> карбоцистеин – 20,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> сахароза – 700,0 мг, ароматизатор клубника – 1,0 мг, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) – 1,5 мг, натрия гидроксид – до pH 6,10 – 6,30, вода очищенная – до 1,0 мл. <u>Дозировка 50 мг/мл</u> <i>действующее вещество:</i> карбоцистеин – 50,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> сахароза – 400,0 мг, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) – 1,5 мг, краситель карамель (Е 150a) – 0,3 мг, натрия гидроксид – до pH 6,10 – 6,30, вода очищенная – до 1,0 мл. Описание Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом клубники (дозировка 20 мг/мл). Прозрачная жидкость от желтого до коричневатого-желтого цвета со слабым характерным запахом (дозировка 50 мг/мл).

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Сироп 20 мг/мл и 50 мг/мл. По 150 мл, 200 мл или 250 мл в темные флаконы из полиэтилентерефталата с навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Сироп 20 мг/мл и 50 мг/мл. По 150 мл, 200 мл или 250 мл в темные флаконы из полиэтилентерефталата с навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена или полиэтилена высокой плотности. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Представитель фирмы



Н.Ю.Секрет