

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Либексин Муко®

наименование лекарственного препарата

сироп 50 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Юнитер Ликвид Мануфэкчуринг, Франция

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » 20 12 12 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ <i>Со стороны желудочно-кишечного тракта:</i> иногда отмечается тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение. <i>Аллергические реакции:</i> зуд, крапивница, экзантема, ангионевротический отек.	ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ <i>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта</i> иногда отмечается тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение. <i>Нарушения со стороны иммунной системы:</i> аллергическая кожная сыпь и анафилактические реакции, включая крапивницу, ангионевротический отек; зуд, экзантема, стойкая лекарственная эритема. <i>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:</i> отдельные случаи буллезного дерматита, включая синдром Стивенса-Джонсона и многоформную (экссудативную) эритему.
<i>Прочие:</i> головокружение, слабость, недомогание.	<i>Прочие:</i> головокружение, слабость, недомогание.

Зам. руководителя отдела регистрации

М.Н. Маликова

