

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Либексин Муко[®]

наименование лекарственного препарата

сироп, 50 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

Юнитер Ликвид Мануфэкчуринг, Франция

А. Наттерманн энд Сие. ГмбХ, Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 5

110116


Дата внесения изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
С осторожностью - Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе. - Период грудного вскармливания.	С осторожностью - Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе (см. раздел «Особые указания»). - Период грудного вскармливания. - Пациенты пожилого возраста (см. раздел «Особые указания»). - Одновременный прием препаратов, повышающих риск развития желудочно-кишечного кровотечения (см. раздел «Особые указания»).

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Содержание этанола в препарате составляет 1,64 %, то есть - 0,2 г этанола на мерный стаканчик, что следует учитывать при применении препарата Либексин Муко® при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, травмах или заболеваниях головного мозга. При назначении препарата Либексин Муко® пациентам с сахарным диабетом или пациентам, находящимся на низкоуглеводной диете, следует принимать во внимание, что 1 мерный стаканчик сиропа (15 мл) содержит 6 г	Особые указания Следует соблюдать осторожность при применении препарата Либексин Муко® у пациентов пожилого возраста, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, при одновременном приеме препаратов, повышающих риск развития желудочно-кишечных кровотечений (см. раздел «С осторожностью»). При развитии желудочно-кишечного кровотечения следует прекратить прием препарата. Содержание этанола в препарате составляет 1,64 %, то есть 0,2 г этанола на мерный стаканчик, что следует учитывать при применении препарата Либексин Муко® при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, травмах или заболеваниях головного мозга. При назначении препарата Либексин Муко® пациентам с сахарным диабетом или пациентам, соблюдающим низкоуглеводную диету, следует принимать во внимание, что 1 мерный стаканчик

Старая редакция	Новая редакция
сахарозы. При соблюдении пациентами бессолевой или низкосолевой диеты следует принимать во внимание, что 1 мерный стаканчик сиропа (15 мл) содержит 97 мг натрия: Так как препарат Либексин Муко® содержит сахарозу, его применение не рекомендуется у пациентов с дефицитом сахаразы/изомальтазы, непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы.	сиропа (15 мл) содержит 6 г сахарозы. При соблюдении пациентами бессолевой или низкосолевой диеты следует принимать во внимание, что 1 мерный стаканчик сиропа (15 мл) содержит 97 мг натрия. Так как препарат Либексин Муко® содержит сахарозу, его применение не рекомендуется у пациентов с дефицитом сахаразы/изомальтазы, непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы.

Менеджер по регистрации



Кошель А.Ю.