

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПАНАВИР® (PANAVIR®)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ПАНАВИР®

ГРУППИРОВОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Картофеля побегов сумма полисахаридов

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: Суппозитории вагинальные.

СОСТАВ (НА 1 СУППОЗИТОРИЙ):

активный компонент – Панавир® (картофеля побегов сумма полисахаридов) – 200 мкг;

вспомогательные вещества: макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) – 1,2599 г,
макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) – 0,1399 г.

Масса суппозитория – 1,4 г.

ОПИСАНИЕ:

Суппозитории полупрозрачные, от белого до серовато-белого цвета, торпедообразной формы, без запаха.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Противовирусное и иммуномодулирующее средство.

КОД АТХ: J05AX.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Основное действующее вещество – гексозный гликозид, состоящий из глюкозы, рамнозы, арабинозы, маннозы, ксилозы, галактозы, уроновых кислот.

Препарат Панавир® является противовирусным и иммуномодулирующим средством.

Обладает противовирусным действием в отношении вирусов простого герпеса 1 и 2 типов.

Повышает неспецифическую резистентность организма к различным инфекциям и способствует индукции интерферонов.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата не изучалась в связи с его химической природой и малыми действующими дозами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Генитальный герпес у женщин (в комплексной терапии).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые заболевания почек и селезенки, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания. При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание на время применения препарата следует прекратить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Интравагинально. Вагинальные суппозитории вводят вечером во влагалище, как можно глубже, в положении лежа на спине при слегка согнутых ногах, ежедневно в течение 5 дней по 1 вагинальному суппозиторию. Повторный курс лечения возможен после консультации врача.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях возможны аллергические реакции.

При появлении указанных нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Если Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров.

При отсутствии терапевтического эффекта следует обратиться к врачу, в том числе для подтверждения диагноза.

**ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ
СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ****УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ФОРМА ВЫПУСКА

Суппозитории вагинальные 200 мкг.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки или из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом. Каждую контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре от 2 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Отпускают по рецепту.

**ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ/ОРГАНИЗАЦИЯ,
ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

ООО «Национальная Исследовательская Компания», Россия, 301404, Тульская обл., Суворовский р-он, д. Варушицы, д. 104, тел./факс: 8-800-555-222-9.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Альтфарм», Россия, 142073, Московская обл., г. Домодедово, д. Судаково, тер. Лесное, стр.10б.