

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
РектАктив®

Регистрационный номер:

Торговое название: РектАктив®.

Лекарственная форма: Суппозитории ректальные.

Состав:

1 суппозиторий содержит конского каштана плодов экстракта сухого, содержащего 20 % суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин 50 мг или 100 мг и суппозиторную основу витепсол Н 15 до массы суппозитория 1 г.

Описание:

Суппозитории дозировкой 50 мг светло-коричневого цвета торпедообразной формы. Суппозитории дозировкой 100 мг коричневого цвета торпедообразной формы. На поверхности и на срезе суппозитория допускаются вкрапления темно-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Слабительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: А06АХ

Фармакологические свойства:

Тритерпеновый сапонин эсцин, содержащийся в экстракте конского каштана стимулирует интерорецепторы слизистой оболочки прямой кишки, вызывая усиление ее перистальтики и быструю эвакуацию каловых масс. Эффект наступает через 5-15 мин после применения суппозитория. Позывы к опорожнению кишечника прекращаются после акта дефекации. Препарат не вызывает растяжения стенок прямой кишки, укрепляет и тонизирует гладкую мускулатуру этого органа. При курсовом применении препарат восстанавливает дефекационный рефлекс и нормализует биоритм дефекации.

Показания к применению:

Запоры: функциональные (привычные, старческие, запоры у малоподвижных больных, запоры, связанные с понижением чувствительности рецепторного аппарата прямой кишки и нарушением биоритма дефекации).

Противопоказания:


Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, острый геморрой, острый проктит и парапроктит, спастический запор, опухоли и трещины прямой кишки.

Беременность и грудное вскармливание:

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода и младенца.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку) 1 раз в сутки за 5-15 мин до запланированного акта дефекации. Чтобы вынуть суппозиторий из ячейковой упаковки, отломить одну ячейку с суппозиторием по насечке и разведя края ленты потянуть за них в разные стороны. Суппозиторий ввести в задний проход заостренным концом, по возможности глубоко. Для более удобного введения суппозитория рекомендуется нагнуться, присесть на корточки или лечь на бок, поджав ноги.



Разовая доза для взрослых 50-100 мг 1 раз в сутки; максимальная разовая доза - 300 мг; максимальная суточная доза – 300 мг.

Длительность лечения не более 30 дней. Дальнейшее лечение препаратом возможно только после консультации с врачом.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения в прямой кишке.

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные 50 мг и 100 мг.

По 1 и по 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.

По 1 контурной упаковке с 1 суппозиторием в картонном вкладыше. По 2 картонных вкладыша вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

По 1 или по 2 контурные ячейковые упаковки с 5 суппозиториями вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения:

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

1 год 10 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту.

Производитель:

ООО «Альтфарм»

142073, Россия, Московская обл., Домодедовский р-н, д. Судаково, д/о «Лесное»,

тел./факс: (495) 234-46-40, по заказу ОАО «СКС-АЛЬЯНС», Россия.

Директор ИДКЭЛС

Буданов С.В.

Представитель фирмы

Суворова Е.А.



Handwritten signature