

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

РектАктив®
суппозитории ректальные 50 мг, 100 мг
ООО «Альтфарм», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» 221018 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: РектАктив®. Международное непатентованное или группировочное наименование: раздел отсутствует. Состав на один суппозиторий: <i>Активное вещество:</i> Каштана конского плодов экстракта сухого, содержащего 20 % суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин 50 мг или 100 мг <i>Вспомогательное вещество:</i> Жирных кислот глицеридов (Витепсол Н 15, Жира твердого) достаточное количество для получения суппозитория массой 1,0 г Описание: Суппозитории дозировкой 50 мг светло-коричневого цвета торпедообразной формы. Суппозитории дозировкой 100 мг коричневого цвета торпедообразной формы. На поверхности и на срезе суппозитория допускаются вкрапления темно-коричневого цвета. Показания к применению:	Торговое наименование: РектАктив®. Международное непатентованное или группировочное наименование: Каштана конского семян экстракт. Состав на один суппозиторий: <i>Активный компонент:</i> Каштана конского семян экстракт (Каштана конского экстракт сухой), содержащий 20 % суммы тритерпеновых сапонинов в пересчете на эсцин 50 мг или 100 мг. <i>Вспомогательное вещество:</i> Жирных кислот глицериды (Витепсол Н 15, Твердый жир Керносол 35) 0,95 г или 0,90 г Описание: Суппозитории от светло-коричневого цвета до коричневого цвета торпедообразной формы. На поверхности и на срезе суппозитория допускаются вкрапления темно-коричневого цвета. Показания к применению: Симптоматическое лечение запора, включая привычный и хронический запор, гипотоническую дискинезию толстой

Запоры: функциональные (привычные, старческие, запоры у малоподвижных больных, запоры, связанные с понижением чувствительности рецепторного аппарата прямой кишки и нарушение биоритма дефекации).

Противопоказания:

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, острый геморрой, острый проктит и парапроктит, спастический запор, опухоли и трещины прямой кишки.

Беременность и грудное вскармливание:

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода и младенца.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку) 1 раз в сутки за 5 - 15 мин до запланированного акта дефекации.

Чтобы вынуть суппозиторий из ячейковой упаковки, отломить одну ячейку с суппозиторием по насечке и разъединив края ленты потянуть за них в разные стороны. Суппозиторий ввести в задний проход заостренным концом, по возможности глубоко. Для более удобного введения суппозитория рекомендуется нагнуться, присесть на корточки или лечь на бок, поджав ноги.

Разовая доза для взрослых 50 -100 мг 1 раз в сутки; максимальная разовая доза - 300 мг; максимальная суточная доза – 300 мг.

Длительность лечения не более 30 дней.

Дальнейшее лечение препаратом возможно только после консультации с врачом.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения в прямой кишке.

кишки (например, у лежачих и пожилых пациентов).

Противопоказания:

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, острый геморрой, острый проктит и парапроктит, спастический запор, опухоли и трещины прямой кишки, выраженное обезвоживание, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально (вводят в прямую кишку) 1 раз в сутки за 5 - 15 мин до запланированного акта дефекации.

Чтобы вынуть суппозиторий из ячейковой упаковки, отломить одну ячейку с суппозиторием по насечке и разъединив края ленты потянуть за них в разные стороны. Суппозиторий ввести в задний проход заостренным концом, по возможности глубоко. Для более удобного введения суппозитория рекомендуется нагнуться, присесть на корточки или лечь на бок, поджав ноги.

Разовая доза для взрослых 50 -100 мг 1 раз в сутки; максимальная разовая доза - 300 мг; максимальная суточная доза – 300 мг.

Длительность одного курса лечения препаратом 14 дней. Дальнейшее лечение препаратом возможно после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка: раздел отсутствует.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: раздел отсутствует.

Особые указания: раздел отсутствует.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: раздел отсутствует.

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные 50 мг и 100 мг. По 1 и по 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.

По 1 контурной упаковке с 1 суппозиторием в картонном вкладыше. По 2 картонных вкладыша вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

По 1 или по 2 контурные ячейковой упаковки с 5 суппозиториями вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения:

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

1 год 10 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

ООО «Альтфарм»
142073, Россия, Московская обл.,
Домодедовский р-н, д. Судаково, д/о
«Лесное»,
тел./факс: (495) 234-46-40, по заказу ОАО
«СКС-АЛЬЯНС», Россия.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможны аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения в прямой кишке. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В этом случае следует прекратить применение препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о случаях взаимодействия с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания:

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные 50 мг и 100 мг. По 5 суппозитория в упаковывают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной

	полиэтиленом. По 1 или по 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Условия хранения: При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности. Условия отпуска: Отпускают без рецепта. Производитель: ООО «Альтфарм» 142073, Россия, Московская область, г. Домодедово, д. Судаково, территория вл. Лесное, стр. 10б. Тел.: (495) 234-46-40.
--	---

Генеральный директор
ООО «Альтфарм»



 Е.А. Суворова