

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению препарата
ПЕРХОТАЛ

Регистрационный номер:

Торговое название: Перхотал

Международное непатентованное название: Кетоконазол

Лекарственная форма: Мазь для наружного применения

Состав:

В 100 г мази содержится:

Активное вещество:

Кетоконазол.....2,0 г

Вспомогательные вещества:

макрогола 400, макрогола 4000.

Описание: однородная мазь белого цвета.


Фармакотерапевтическая группа: Противогрибковое средство.

Код АТХ: [D01AC08]

Фармакологическое действие

Фармакодинамика.

Кетоконазол, производное имидазол-диоксалина, обладает противогрибковым действием в отношении дерматофитов, таких как *Trichophyton* sp., *Epidermophyton* sp., *Microsporum* sp., дрожжеподобных грибов, таких как *Candida* sp., диморфных грибов, эумицетов и *Malassezia furfur* (*Pityrosporum ovale*). Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерина и липидов мембраны (ТГ и фосфолипидов), необходимых для синтеза клеточной стенки грибов (грибы теряют способность к образованию нитей и колоний), и нарушении проницаемости клеточной стенки. Ингибирует трансформацию бластоспор *Candida albicans* в инвазивные формы. Кетоконазол проявляет противогрибковую активность в отношении *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*, вызывающих избыточное шелушение кожи, также активен в отношении стафилококков и стрептококков.



Фармакокинетика.

Всасывание действующего вещества через кожу при местном применении незначительно. При длительном применении содержание кетоконазола в крови не определяется.

Показания к применению

Местное лечение микозов, вызванных чувствительными к препарату грибами: паховая эпидермофития, эпидермофития кистей и стоп, кандидоз кожи, отрубевидный лишай, себорейный дерматит, вызванный *Pityrosporum ovale*.

Противопоказания

Мазь ПЕРХОТАЛ не следует применять при повышенной чувствительности к кетоконазолу, при нарушении целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения мази, женщинам в период лактации.

С осторожностью

В результате клинических исследований кетоконазол в плазме не обнаружен, тем не менее, женщинам в период беременности следует принимать препарат с осторожностью.

Способ применения и дозы

При дерматомикозе гладкой кожи (паховой эпидермофитии, эпидермофитии кистей и стоп, кандидозе кожи и отрубевидном лишае) мазь наносят на пораженную и непосредственно прилегающую к ней область 1 раз в сутки.

При себорейном дерматите мазь наносят на пораженную область 2 раза в сутки.

Средняя продолжительность лечения составляет:

При дерматомикозе гладкой кожи – 3-4 недели,


При паховой эпидермофитии – 2-4 недели,

При эпидермофитии стоп – 4-6 недель,

При инфекциях, вызванных дрожжеподобными грибами – 2-3 недели,

При отрубевидном лишае – 2-3 недели,

При себорейном дерматите – 2-4 недели.



Побочное действие

При местном применении мази ПЕРХОТАЛ возможны местные аллергические реакции в виде жжения, крапивницы и кожной сыпи. В редких случаях возникает контактный дерматит.

Передозировка

Поскольку препарат предназначен только для наружного применения и практически не всасывается в системный кровоток, развитие симптомов передозировки маловероятно. При случайном приеме мази внутрь следует провести промывание желудка и провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственное взаимодействие препарата ПЕРХОТАЛ при наружном применении не описано.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения, не применяют в офтальмологической практике. Следует избегать попадания мази в глаза.


При комбинированном длительном применении с местными лекарственными формами глюкокортикостероидов (ГКС) для предотвращения развития синдрома "отмены" рекомендуется использовать ГКС утром, а мазь ПЕРХОТАЛ - вечером, с последующей постепенной отменой ГКС в течение 2-3 недель.

Во время лечения следует соблюдать общие правила гигиены.

Информация о наличии каких-либо неблагоприятных эффектов у детей отсутствует, эффективность и безопасность применения у них не установлены.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 2 %; по 15 мг в пластиковые тубы с завинчивающейся пластиковой крышкой; по 1 тубе вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.



Условия хранения

При температуре не выше 30°C.

В недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель:

«Джепак Интернейшенл», Индия.

Б-13, Чанд Сосайти, Джуху Чарч Роуд,
Мумбай-400049, Индия.

**За дополнительной информацией обращаться
в представительство фирмы**

«Джепак Интернейшенл»

123098 г. Москва, ул. Новошукшинская, д. 5

т/факс 8-499-196-48-11, 8-499-196-49-02

И.о. директора ИДКЭЛС



А.Н. Васильев

Исполнительный директор



Гавин Ганди