

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)
по медицинскому применению препарата
ПЕРХОТАЛ

Регистрационный номер:

Торговое название: ПЕРХОТАЛ

Международное непатентованное название – кетоконазол

Лекарственная форма – шампунь

Состав:

В 100 г шампуня содержится:

активное вещество: кетоконазол 1 г или 2 г

Вспомогательные компоненты:

Натрия лаурилсульфат, диэтаноламид кокосового масла жирных кислот, полисорбат 80, натрия хлорид, пропиленгликоль, динатрия эдетат, хлористоводородная кислота, троламин, акриламида и диаллилдиметиламмония хлорида сополимер (поликватерниум-7), этиленгликоля моностеарат, вода очищенная.

Ароматические добавки и красители:


Шампунь 1% - Ароматизатор SSB D 01274, краситель бриллиантовый голубой, E133

Шампунь 2% - Ароматизатор AL 012403, краситель пунцовый (Понсо 4R), E 124

Описание

1% шампунь – однородная вязкая перламутровая жидкость голубого цвета с приятным парфюмерным запахом.

2% шампунь - однородная вязкая перламутровая жидкость розового цвета с приятным парфюмерным запахом.



Фармакотерапевтическая группа противогрибковое средство**Код АТХ: [D01AC08]****Фармакологическое действие****Фармакодинамика.**

Кетоконазол, синтетическое производное имидазол-диоксалана, обладает противогрибковым действием в отношении дерматофитов, таких как *Trichophyton* sp., *Epidermophyton* sp., *Micosporum* sp., и дрожжеподобных грибов, таких как *Candida* sp. и *Malassezia furfur* (*Pityrosporum ovale*).

Кетоконазол проявляет противогрибковую активность в отношении *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*, вызывающих избыточное шелушение кожи.

Шампунь ПЕРХОТАЛ быстро уменьшает шелушение и зуд кожи головы, которые обычно ассоциируются с перхотью и себорейным дерматитом.

Фармакокинетика

Всасывание действующих веществ через кожу при местном применении незначительно. Поскольку даже при длительном применении содержание кетоконазола в крови не определяется, можно прийти к заключению, что системным действием препарат не обладает.

Показания к применению

Лечение и профилактика поражений кожи волосистой части головы, вызванных дрожжеподобными микроорганизмами *Malassezia furfur* (*Pityrosporum ovale*), таких как отрубевидный лишай, себорейный дерматит волосистой части головы и различные виды перхоти.

Противопоказания

Шампунь ПЕРХОТАЛ противопоказан при наличии повышенной чувствительности к любому из его компонентов.

1. *В. М. Мамов*

С осторожностью

В результате клинических исследований кетоконазол в плазме не обнаружен, тем не менее, женщинам в период беременности и лактации следует принимать шампунь ПЕРХОТАЛ 2 % с осторожностью.

Способ применения и дозы

На пораженные участки кожи или волосистой части головы нанести шампунь ПЕРХОТАЛ 2 % на 3-5 минут, затем промыть водой.

Лечение:

- Отрубевидный лишай: ежедневное применение в течение 5 дней, а при отсутствии эффекта возможно продление курса до 7 дней.
- Себорейный дерматит волосистой части головы и различные виды перхоти: два раза в неделю в течение 1 месяца.

Профилактика:

Для профилактики используется шампунь ПЕРХОТАЛ 1 %


- Отрубевидный лишай: ежедневно в течение 3-5 дней перед наступлением лета.
- Себорейный дерматит волосистой части головы и различные виды перхоти: еженедельно.

Побочное действие

Шампунь ПЕРХОТАЛ 2 %, как правило, хорошо переносится, но могут отмечаться местные реакции:

- местное раздражение кожи, зуд и жжение кожи, повышенная жирность или сухость волос, выпадение волос.
- аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь).

В отдельных случаях, в основном у пациентов с химически поврежденными или седыми волосами, отмечалось изменение цвета волос.



Передозировка

При использовании шампуня ПЕРХОТАЛ развитие передозировки не предполагается, так как препарат предназначен только для наружного применения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственное взаимодействие препарата ПЕРХОТАЛ при наружном применении не описано.

Особые указания


Следует избегать попадания в глаза. При попадании шампуня в глаза необходимо промыть их водой. При случайном попадании внутрь не рекомендуется вызывать рвоту или использовать промывание желудка, для предотвращения аспирации (попадания рвотных масс в легкие).

При комбинированном длительном применении с местными лекарственными формами глюкокортикостероидов (ГКС) для предотвращения развития синдрома "отмены" рекомендуется использовать ГКС утром, а шампунь ПЕРХОТАЛ - вечером, с последующей постепенной отменой ГКС в течение 2-3 недель.

Информация о наличии каких-либо неблагоприятных эффектов у детей отсутствует, эффективность и безопасность применения у них не установлены.

Форма выпуска

Шампунь 1 % и 2 %, по 25 мл, 60 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл и 250 мл в пластиковые флаконы с завинчивающейся пластиковой крышкой; флакон упаковывают в пленку термоусадочную; по 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку; по 5 мл в саше, по 25 или 5 саше вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.



Условия хранения

При температуре не выше 25°C

В недоступном для детей месте

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель:

«Джепак Интернейшенл», Индия.
Б-13, Чанд Сосайти, Джуху Чарч Роуд,
Мумбай-400049, Индия.

**За дополнительной информацией обращаться
в представительство фирмы**

«Джепак Интернейшенл»
123098 г. Москва, ул. Новошукунинская, д. 5
т/факс 8-499-196-48-11, 8-499-196-49-02

И.о. директора ИСКЛС

А.Н.Васильев

Исполнительный директор
«Джепак Интернейшенл»

Гавин Ганди

